

PROSPECT

FIPRIN

COMPOZIȚIE

Un tub:

(0,50 ml) conține fipronil 50 mg

(0,67 ml) conține fipronil 67 mg

(1,34 ml) conține fipronil 134 mg

(2,68 ml) conține fipronil 268 mg

(4,02 ml) conține fipronil 402 mg

Soluție spot-on.

Soluție transparentă, de culoare galbenă - verde-gălbuie.

SPECII ȚINTĂ

Câini.

INDICAȚII

Tratamentul și profilaxia infestării cu purici (*Ctenocephalides* spp.) și a dermatitei alergice asociată cu purici (FAD) la câini. Tratamentul și profilaxia infestării cu căpușe (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) și păduchi (*Trichodectes canis*) la câini.

POSOLOGIE

Datorită lipsei datelor, intervalul minim între două aplicări este de 4 săptămâni.

Mod de administrare: aplicare spot-on.

Dozajul depinde de greutatea animalului.

Câini cu greutatea între 2–10 kg: conținutul unui tub de 0,67 ml (S).

Aceasta asigură doza minimă recomandată de fipronil de 6,7 mg/kg greutate corporală.

Tratamentul lunar este recomandat în caz de risc crescut de reinfestare cu purici, în cazul în care câinele este alergic la înțepăturile de purici, pentru controlul infestării cu căpușe sau dacă animalul este spălat frecvent cu șampoane hipoalergenice sau hidratante. În regiunile unde nivelul de infestare cu purici și căpușe nu este ridicat, FIPRIN spot-on pentru câini poate fi aplicat o dată la două sau trei luni.

FIPRIN spot-on pentru câini este eficient împotriva puricilor timp de aproximativ două luni și împotriva căpușelor timp de maximum o lună, în funcție de nivelul contaminării mediului.

Puricii sunt eliminați în termen de 24 de ore de la infestare.

VALABILITATE

24 luni. A se utiliza imediat după deschiderea pungii.

DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare în ceea ce privește temperatura. A se păstra în ambalajul original, pentru a proteja produsul de lumină. A se păstra într-un loc ferit de umezeală.

MĂRIMEA AMBALAJULUI

1, 3 sau 25 de tuburi cu doză unică.