

DIXIE 50 mg

soluție spot-on pentru pisici

COMPOZIȚIE

Fiecare pipetă de 0,5 ml conține:

Substanța activă:

Fipronil.....50 mg

Excipienți

Butilhidroxianisol (E320).....0,10 mg

Butilhidroxitoluen (E321).....0,05 mg

Soluție spot-on.

Soluție limpede, incoloră spre galbenă.

INDICAȚII

Tratamentul și prevenirea infestărilor cu purici (*Ctenocephalides felis*). Puricii prezenți pe corpul animalului la momentul aplicării produsului vor fi omorâți în decurs de 48 de ore. Produsul are o eficacitate insecticidă persistentă cu o durată de 4 săptămâni împotriva puricilor *Ctenocephalides felis*.

Tratamentul și prevenirea infestărilor cu căpușe (*Rhipicephalus turanicus*). Căpușele prezente pe corpul animalului la momentul aplicării produsului vor fi omorâte în 48 de ore. Produsul are o eficacitate acaricidă persistentă cu o durată de 4 săptămâni împotriva căpușelor *Rhipicephalus turanicus*.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la pisoii cu vârsta mai mică de 9 săptămâni și/sau cu o greutate mai mică de 1 kg.

Nu se utilizează la animale bolnave (boli sistemice, febră, etc.) sau convalescente.

Nu se utilizează pentru iepuri, pot surveni reacții adverse sau chiar moartea.

Nu aplicați produsul pe răni sau pe pielea deteriorată.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REAȚII ADVERSE

În cazul în care animalul linge zone de aplicare, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivație, în principal din cauza naturii excipienților.

Printre reacțiile adverse extrem de rare suspectate, după utilizare au fost raportate reacții cutanate tranzitorii la locul de aplicare (decolorarea pielii, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau alopecie. În mod excepțional, după utilizare au fost observate hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestenzie, depresie, semne nervoase), vărsături sau semne respiratorii.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10000 animale, inclusiv raportările izolate)

Dacă observați orice reacții adverse grave sau alte reacții care nu sunt menționate în acest prospect, informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Pisici.

DOZAJ ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare spot-on. 1 pipetă de 0,5 ml pentru fiecare pisică.

Mod de administrare

Țineți pipeta în poziție verticală. Bateți ușor partea îngustă a pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul se află în corpul principal al pipetei.

Rupeți capătul predecupat al pipetei spot-on de-a lungul liniei marcate. Dați la o parte blana dintre omoplați până când pielea devine vizibilă. Așezați vârful pipetei pe piele și strângeți ușor într-unul sau două locuri, pentru a goli conținutul pe piele.

Aveți grijă să evitați umezirea excesivă a părului cu produsul, deoarece acest lucru va determina un aspect lipicios al părului la locul tratamentului. Totuși dacă se întâmplă acest lucru, va dispărea în 24 de ore după aplicare.

În absența studiilor privind siguranța, nivelul minim între tratament este de 4 săptămâni.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se aplică.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutia de carton.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

În perioada de eficacitate preconizată, căpușele vor fi omorâte și vor cădea de pe corpul gazdei în decurs de 48 de ore de la infestare, în general fără a se fi hrănit cu sângele animalului. Cu toate acestea, se poate produce atașate izolată a căpușelor după tratament și, prin urmare, transmiterea bolii infecțioase de către căpușe nu poate fi exclusă. După ce sunt omorâte, căpușele vor cădea în majoritatea cazurilor de pe corpul animalului, iar căpușele rămase pot fi îndepărtate cu atenție.

Efectul îmbăierii/scufundării în apă sau al șamponării asupra eficacității produsului nu a fost investigat și, prin urmare, acestea nu pot fi recomandate, în special în decurs de 2 zile de la aplicarea produsului.

Pentru controlul optim al problemelor legate de purici într-o gospodărie cu mai multe animale de casă, trebuie ca toți câinii și toate pisicile să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii de pa animalele de companie infestază deseori coșul animalului, locul în care aceste se culcă și zonele în care se odihnește de obicei, cum ar fi covoarele și obiectele moi de mobilier, care trebuie tratate, în caz de infestare masivă și la începutul măsurilor de control, cu un insecticid adecvat și prin aspirare regulată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA ANIMALE

Numai pentru uz extern.

Evitați contactul produsului cu ochii animalului.

Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de tratament.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă unde animalul nu poate să îl lingă și să vă asigurați că animalele nu se ling unele pe celelalte după tratament.

PRECAUȚII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura și ochii. În cazul expunerii oculare accidentale sau iritației ochilor în timpul administrării, aceștia trebuie clătiți imediat și abundent cu apă curată. Dacă iritația ochilor persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Evitați contactul produsului cu degetele. În cazul expunerii cutanate, spălați imediat cu apă și săpun.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu fumați, nu consumați băuturi sau alimente în timpul aplicării.

Animalele tratate nu trebuie atinse și nu trebuie să li se permită copiilor să se joace cu ele până când locul de aplicare nu este uscat. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, ci seara devreme, iar animalele tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu stăpânii, în special cu copiii.

Păstrați pipetele stocate în ambalajul original până când sunt gata de utilizare. Pentru a împiedica accesul copiilor la pipetele utilizate, eliminați imediat pipetele utilizate.

GESTAȚIE ȘI LACTAȚIE

Studiile de laborator efectuate pe șobolani nu au demonstrat existența efectelor teratogene sau fetotoxice.

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc, efectuată de medicul veterinar responsabil.

SUPRADOZARE

Nu au fost observate efecte adverse în studiile privind siguranța efectuate la specia țintă, respectiv pisici și pisoi cu vârsta de 9 săptămâni și cu o greutate de aproximativ 1 kg, în care animalelor li s-a administrat doza recomandată, de trei ori (x3) și respectiv de cinci ori (x5) doza recomandată. Riscul apariției efectelor poate totuși să crească la supradozare (vezi Reacții adverse). După tratament poate apărea mâncărimea.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unors astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Fipronil poate fi nociv pentru organismele acvatice. Nu contaminați iazurile, cursurile de apă sau șanțurile cu produsul sau recipientele goale.

AMBALAJ

Dimensiunile ambalajului:

Cutie de carton care conține 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120 sau 150 de pipete.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de comercializare.