

## DIXIE SPOT ON

### COMPOZIȚIE

#### SUBSTANȚA ACTIVĂ

| Greutatea câinelui                    | Volumul dozei unitare (ml) Fipronil (mg) |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Câini de talie mică – 2-10 kg         | 0,67                                     | 67  |
| Câini de talie medie – 10-20 kg       | 1,34                                     | 134 |
| Câini de talie mare – 20-40 kg        | 2,68                                     | 268 |
| Câini de talie foarte mare – 40-60 kg | 4,02                                     | 402 |

#### EXCIPIENȚI

| Greutatea câinelui                    | Butilhidroxianisol (E320)<br>(mg) | Butilhidroxitoluen (E321)<br>(mg) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Câini de talie mică – 2-10 kg         | 0,13                              | 0,07                              |
| Câini de talie medie – 10-20 kg       | 0,27                              | 0,13                              |
| Câini de talie mare – 20-40 kg        | 0,54                              | 0,27                              |
| Câini de talie foarte mare – 40-60 kg | 0,80                              | 0,40                              |

### INDICAȚII

Tratamentul infestărilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) și prevenirea reinfestării cu purici prin efectul insecticid de până la 5 săptămâni. O aplicare asigură eficacitatea insecticidă imediată și persistentă și previne infestațiile noi cu purici, până la maxim 5 săptămâni.

Produsul previne infestațiilor noi cu căpușe *Rhipicephalus sanguineus* din ziua 9 până în ziua 23 după aplicarea produsului. Produsul nu a demonstrat un efect acaricid imediat, dacă sunt prezente căpușe din aceste specii atunci când produsul este aplicat, este posibil ca nu toate căpușele să fie omorâte în primele 48 de ore, dar acestea pot fi omorâte în decurs de o săptămână.

Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei pentru tratamentul dermatitei alergice provocate de purici (DAP), diagnosticată anterior de un medic veterinar.

## **SPECII ȚINTĂ**

Câini.

## **DOZAJ ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Cale de administrare – utilizare spot-on.

### Posologie

1 pipetă de 0,67 ml per câine cu greutate corporală peste 2 kg și până la 10 kg

1 pipetă de 1,34 ml per câine cu greutate corporală peste 10 kg și până la 20 kg

1 pipetă de 2,68 ml per câine cu greutate corporală peste 20 kg și până la 40 kg

1 pipetă de 4,02 ml per câine cu greutate corporală peste 40 kg și până la 60 kg

Pentru câinii de peste 60 kg, utilizați două pipete de 2,68 ml.

### Mod de administrare

Țineți pipeta în poziție verticală. Bateți ușor partea îngustă a pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul se află în corpul principal al pipetei.

Rupeți capătul predecupat al pipetei spot-on de-a lungul liniei marcate. Dați la o parte blana dintre omoplați până când pielea devine vizibilă. Așezați vârful pipetei pe piele și strângeți ușor într-unul sau două locuri, pentru a goli conținutul pe piele.

Aveți grijă să evitați umezirea excesivă a părului cu produsul, deoarece acest lucru va determina un aspect lipicios al părului la locul tratamentului. Totuși dacă se întâmplă acest lucru, va dispărea în 24 de ore după aplicare.

În absența studiilor privind siguranța, nivelul minim între tratament este de 4 săptămâni.