

CANIVERM PASTĂ ORALĂ

Pastă antiparazitară pentru câini, pisici, feline și canide

COMPOZIȚIE - 1 ml de pastă conține:

Substanțe active:

Fenbendazolum 75 mg

Pyranteli embonas 72 mg

Praziquantelum 25 mg

Excipient:

Butylhydroxyanisole 0.2 mg

INDICAȚIE (INDICAȚII):

Boli cauzate de helminți la câini și pisici (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*).

CONTRAINDICAȚII:

Cisticercozele oculare și neurocisticercozele spinale. Tulburări hepatice. A nu se administra împreună cu preparate pe bază de piperazină sau alte preparate antiparazitare. A nu se folosi dacă există hipersensibilitate la substanțele active sau excipienți.

REAȚII ADVERSE:

La câteva ore după administrare pot apărea stări subfebrile însoțite de hipersalivație, vomă, urticarie și fecale semilichide. Aceste simptome apar din cauza proteinelor rezultate în urma paraziților omorâți și nu sunt reacții adverse la substanța activă din produs. Medicamentul poate produce somnolență la animale.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ:

Câini și pisici

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Dozare:

Doza recomandată este de 15 mg of fenbendazol, 14.4 mg de pyrantel embonate și 5 mg de praziquantel per kilogram greutate vie, ce corespunde la 1 ml de pasta per 5 kg greutate vie.

Pisică:

- 0.5 ml de pastă per 0.5-2 kg greutate vie
- 1 ml de pastă per 2.1-5 kg greutate vie

Câine:

- 0.5 ml de pastă pentru 0.5-2 kg greutate vie
- 1 ml de pastă pentru 2.1-5 kg greutate vie
- și apoi 1 ml de pasta pentru fiecare 5 kg greutate vie

CANIVERM pastă orală este destinat administrării orale.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Aplicatorul oferă posibilitatea ajustării astfel încât să dozeze medicamentul conform schemei de mai sus. Prin poziționarea inelului de cauciuc pe pistonul aplicatorului va putea fi eliberat volumul dorit.

Asigurați-vă că animalul nu are mâncare în gură. Degajați vârful aplicatorului. Introduceți aplicatorul în gura animalului și depuneți pasta la baza limbii.

Ridicați imediat capul animalului și asigurați-vă că a înghițit toată pasta administrată.

A nu se administra împreună cu produse lactate.

Doza trebuie administrată într-o singură aplicație.

La pui, se recomandă să fie administrat de la 3 săptămâni până la 12 săptămâni o singură aplicație la interval de 3 săptămâni și apoi, regulat, la fiecare 3 luni.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Nu se utilizează la animale destinate consumului uman

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe ambalaj. După deschidere se va utiliza în 6 luni

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Precauții speciale pentru utilizare la animale

În cazul folosirii la cățelele gestante, dozarea trebuie să fie foarte precisă. Eventualele reacții adverse trebuie comunicate medicului veterinar. Produsul nu e recomandat la animale cu simptome de alte parazitoze ale tractusului digestiv. În cazul în care este utilizat frecvent la același individ paraziții pot dezvolta rezistență față de fiecare grup de antihelmintice. Evitați subdozarea prin subevaluarea greutății sau alte erori de administrare

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pe durata manipulării produsului e interzis fumatul și consumul de alimente.

După manipularea produsului spălați bine mâinile cu apă și săpun.

Produsul poate produce iritații ale pielii și ochilor. Evitați contactul cu pielea sau ochii. În cazul

contactului accidental cu produsul clătiți zona cu un jet de apă curată.

În cazul în care produsul e ingerat sau intră în contact cu ochii prezentați-vă la medic imediat împreună cu eticheta produsului.

Persoanele care prezintă hipersensibilitate la fenbendazol, pyrantel, praziquantel sau alt excipient precum și gravidele trebuie să manipuleze produsul cu grijă.

Când produsul e manipulat mai ales în fabrică și ferme persoanele trebuie să poarte mănuși.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

ALTE INFORMAȚII:

A nu se administra împreună cu preparate pe bază de piperazină sau alte preparate antiparazitare.

A se folosi doar pentru uz veterinar.

AMBALAJ:

Seringă gradată, cu un volum de 4 ml, care conține 4 ml produs.

Seringă gradată, cu un volum de 12 ml, care conține 10 ml produs.