

PROSPECT

PARAKILL

SUBSTANȚE ACTIVE

Fipronil 200 mg/ml.

EXCIPIENȚI

Alcool etilic, tween 80, PVPK 30 și propilenglicol.

INDICAȚII

Se recomandă în prevenirea și combaterea paraziților externi (căpușe, purici, păduchi) la câini și pisici.

Căpușe: *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Rhipicephalus bursa*, *Dermacentor marginatus*, *Dermacentor reticulatus*, *Haemaphysalis punctata*.

Purici: *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*, *Pulex irritans*.

Păduchi: *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animalele mai mici de 6 săptămâni, debile, bătrâne sau alergice la medicament.

REAȚII ADVERSE

Poate apărea o salivare abundentă care se remite în scurt timp.

Reacții adverse rare: reacții cutanate trecătoare la locul aplicării, decolorări ale pielii, alopecie locală, prurit, eritem sau prurit generalizat și alopecie.

SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

DOZE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare topică "spot-on".

Doza: 1 picătură/1 kg greutate vie la animalele de talie mare.

Produsul se aplică la nivelul cefei, în zona în care animalul nu se poate linge. Eficacitatea durează circa 4 săptămâni. Tratamentul se repetă doar la nevoie, după această perioadă.

Simultan cu tratamentul animalului este obligatorie deparazitarea adăpostului pentru prevenirea reinfestării.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul se aplică pe piele, în zona cefei. Dacă este necesară o cantitate mai mare, aceasta se aplică în mai multe puncte în aceeași zonă.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de surse de căldură sau foc deschis.

A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe etichetă.

Valabilitate după prima deschidere: 120 zile.

Valabilitate ambalaj nedeschis: 2 ani.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Pentru fiecare specie țintă:

După aplicare, animalele trebuie ferite de ploaie.

Evitați contactul cu ochii animalului și ai operatorului.

Spălați mâinile după utilizare.

Precauții pentru utilizare la animale:

Nu aplicați pe animale cu plăgi cutanate.

Precauții pentru persoanele care administrează produsul:

Evitați contactul cu pielea și ochii.

În caz de ingestie accidentală sau apariția unor reacții alergice, consultați imediat medicul și prezentați eticheta produsului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componente trebuie să evite contactul cu produsul.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE ȘI LACTAȚIE

Se poate utiliza.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

În caz de intoxicație acută, se recomandă tratament simptomatic și măsuri generale de susținere.

ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Se va face conform reglementărilor locale în vigoare.

PROPRIETĂȚI FARMACODINAMICE

Fipronil este un insecticid din clasa fenilpyrazolilor care acționează asupra sistemului nervos al paraziților. Acesta pătrunde prin articulațiile membrelor și stigmele respiratorii, blocând sinapsele și provocând hiperexcitarea nervilor și mușchilor, ceea ce duce la moartea parazitului.

PROPRIETĂȚI FARMACOCINETICE

Fipronilul se acumulează în secrețiile glandelor sebacee și în foliculii piloși, asigurând o acțiune prelungită. Se răspândește în 24 de ore prin translocație. Absorbția prin piele este redusă (~16%) și este urmată de hidroliză. Se excretă predominant prin fecale (75%) și parțial prin urină.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane picurătoare din polipropilenă de 3 ml, 5 ml și 10 ml, fiecare ambalat în cutie individuală de carton.

AUTORIZAȚIE

110337/02.12.2011