BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

Portofoliu

BOVINE
și RUMEGĂTOARE MICI

SOLUȚII VETERINARE COMPLETE
PENTRU SĂNĂTATEA ȘI PERFORMANȚA
RUMEGĂTOARELOR

PREVENȚIE
Sănătate și biosecuritate

TRATAMENT
Soluții eficiente,
recomandate de specialiști



VACCINURI • ANTIBIOTICE • ANTIINFLAMATOARE • ANTIPARAZITARE

HORMONALE • VITAMINE • TONICE DIGESTIVE • ADITIVI FURAJERI

SERINGI INTRAMAMARE / SOLUȚII INTRAUTERINE • SPRAYURI / UNGUENTE

SOLUȚII PENTRU UGER / DETERGENȚI SALĂ DE MULS • MANAGEMENT ȘI BIOSECURITATE

Imaginile și informațiile din catalog au caracter informativ și de prezentare. Produsele pot suferi modificări de design, caracteristici sau specificații.
Pentru informații tehnice detaliate, vă rugăm să consultați prospectele produselor sau să ne contactați.

CUPRINS

VACCINURI 3

ANTIBIOTICE 5

ANTIINFLAMATOARE 7

ANTIPARAZITARE 7

HORMONALE 8

VITAMINE 10

TONICE DIGESTIVE 11

ADITIVI FURAJERI 12

SERINGI INTRAMAMARE / SOLUȚII INTRAUTERINE 14

SPRAYURI / UNGUENTE 15

SOLUȚII PENTRU UGER / DETERGENȚI SALĂ DE MULS 15

MANAGEMENT ȘI BIOSECURITATE 16



BIOBOS RCC

- Protecție împotriva rotavirusului bovin, coronavirusului bovin și *E. coli*; și pentru a crește nivelul imunității pasive a vițeilor împotriva diareei neonatale cauzate de rotavirusul bovin, coronavirusul bovin și E. coli care exprimă adhesin F5 (K99).
- Instalarea imunității:
- imunitatea pasivă începe atunci când viteii se hrănesc cu colostru.
- Durata imunității: viteii hrăniți sunt protejați împotriva rotavirusului bovin timp de 7 zile și împotriva coronavirusului bovin timp de 14 zile.

10 ml - 5 doze; 50 ml - 25 doze
- bovine (juninci și vaci gestante)



BIOBOS IBR MARKER LIVE

- Protecție împotriva Infecției cu virusul BHV-1 (IBR) și pentru reducerea excreției virusului sălbatic.
- Instalarea imunității:
- 7 zile de la vaccinarea intranazală;
- 14 zile de la vaccinarea intramusculară a animalelor fără anticorpi maternali.
- Durata imunității: până la 6 luni de la vaccinarea primară.

10 ml - 5 doze; 50 ml - 25 doze
- viței de la vârsta de 2 săptămâni
- bovine de la vârsta de 3 luni



BOVIBIO RESPI 4

- Protecție împotriva virusului parainfluenza 3, virusului sincițial respirator bovin, virusului diareei bovine, pentru reducerea infecției *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* serotipul A1.
- Instalarea imunității: atinge cel mai ridicat nivel la 3 săptămâni după programul complet de imunizare. Se recomandă o revaccinare la un interval de 6 luni după efectuarea imunizării de bază.
- Durata imunității: după revaccinare, până la 6 luni.

10 ml - 5 doze; 50 ml - 25 doze
- viței de la vârsta de 8 săptămâni
- vaci gestante şi juninci



BIOBOS MASTIGUARD

- Protecție împotriva mastitei cauzate de tulpini mucoide de *Staphylococcus aureus* și *Escherichia coli*.
- Instalarea imunității: la 6 zile după parturiție.
- Durata imunității: până la 150 de zile după parturiție.

5 doze; 25 doze
- bovine (juninci și vaci)



TRICHOBEN

- Protecție împotriva tricofitiei.
- Instalarea imunității: 30 de zile.
- Durata imunității: până la un an.

40 ml;
- viței de la vârsta de 1 zi până la 3 luni
- bovine de la vârsta de 3 luni



MORAXEBIN NEO

- Protecție împotriva keratoconjunctivitei la bovine cu vârsta de o lună şi peste o lună.
- Instalarea imunității: după 14 zile de la vaccinare.
- Durata imunității: până la 9 luni.

100 ml
- bovine de la vârsta de 1 lună



SER CLOSTETAN

- Protecție împotriva Tetanosului
- Serul administrat profilactic oferă imunitate pasivă pentru 7 - 10 zile.

100 ml
- cai, vaci, oi, capre



BIOBOS RESPI 5

- Protecție împotriva BHV-1 (IBR), virusului parainfluenza 3 (PI3V), virusului sincițial respirator bovin (BRSV), virusului diareei virale bovine (BVD), *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* serotipul A1
- Instalarea imunității:
- Împotriva BHV-1 (IBR) - 14 zile de la vaccinarea primară;
- Împotriva PI3V; BRSV; BVD şi *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* serotip A1 - 3 săptămâni de la vaccinarea primară.
- Durata imunității: până la 12 luni de la vaccinarea primară.

5 doze; 25 doze
- viței de la vârsta de 2 săptămâni





ROTAVEC CORONA 10 ml

- Imunizarea activă împotriva E.coli aglutinat F5(K99) antigen, rotavirusului şi coronavirusului.
- Instalarea imunității: imunitatea pasivă începe atunci când viteii se hrănesc cu colostru.

Durata imunității: viteii hrăniți natural sunt protejați împotriva rotavirusului bovin timp de cel puțin 7 zile şi împotriva coronavirusului bovin timp de cel puțin 14 zile.

10 ml - 5 doze; 40 ml - 20 doze
- bovine (juninci și vaci gestante)



BOVILIS CRYPTIUM

- Pentru imunizarea activă a junincilor și vacilor gestante pentru a crește anticorpii în colostrul lor împotriva Gp40 de Cryptosporidium parvum, destinat imunizării pasive a viteilor pentru a reduce semnele clinice (diareea) produse de C. parvum.
- Instalarea imunității: imunitatea pasivă începe atunci când viteii nou-născuți sunt hrăniți cu colostru.
- Durata imunității: până la vârsta de 2 săptămâni.

10 ml (5 doze)
- bovine (juninci și vaci gestante)



BOVILIS BOVIPAST RSP

- Imunoprofilaxia infecțiilor cauzate de Virusul parainfluentei-3, virusul sincitial respirator bovin si *M. Haemolytica* serotip A1.
- Instalarea imunității: 2 săptămâni.
- Durata imunității: nu este stabilită.

40 ml;
- bovine



BOVILIS® INTRANASAL RSP LIVE

- Imunizarea activă a viteilor de la vârsta de 1 săptămână, pentru a reduce semnele clinice de boală respiratorie și eliminarea virusului în urma infecției cu BRSV și Pi3.
- Instalarea imunității:

BRSV:
- 6 zile (pentru viteii vaccinați din ziua naşterii încoace);
- 5 zile (pentru viteii vaccinați de la vârsta de 1 săptămână în sus);

Pi3: - 1 săptămână.

- Durata imunității: până la 12 săptămâni.

100 ml
- bovine de la vârsta de 1 lună



BRAVOXIN 100 ML

- Pentru imunizarea activă împotriva infecțiilor cauzate de *Clostridium perfringens* tip A, B, C și D, *C. chauvoei, C. novyi tip B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum și C. tetani*. Asigură imunizarea pasivă a mieilor și viteilor împotriva acelorași infecții, cu excepția C. haemolyticum la ovine.
- Instalarea imunității:
- la două săptămâni după schema de bază de vaccinare.
- Durata imunității: până la 12 luni, în funcție de specia de Clostridium și de specia animalului.

50 ml, 100 ml
- bovine şi oi.



AMOXYCILLIN KELA 700 MG/G 1 KG

» Metafilaxia (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul infecţiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilină.
Viței: 15 mg/kg greutate corporală de două ori pe zi timp de 4-5 zile. Administrare orală.
Substanţa activă: amoxicilină trihidrat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 5 zile.

1 kg



COLFIVE 5.000.000 UI/ML

» Infecţii enterice cauzate de tulpinile de E. coli neinvazive, susceptibile la colistin sulfat.
100.000 UI colistin sulfat/kg greutate corporală pe zi, timp de 3-5 zile consecutive, administrare orală.
Substanţa activă: colistin sulfat.
Timp de așteptare: Carne şi organe: 1 zi.

1 L



STREPTONAMID

» Tratamentul bolilor infecțioase ale tractului digestiv.
Viței și mânji: 1 plic de două ori/zi, timp de 4-5 zile consecutive.
Substanţa activă: streptomicină sulfat, ftalilsulfatiazol.
Timp de așteptare: Carne şi organe: 15 zile.

5 plicuri 2,8 g



SULFADIMIDIN Bioveta

» Tratamentul bolilor infecţioase cauzate de germeni sensibili la sulfadimidin (coccidioze).
1 plic (20 g)/10 litri de apă, timp de 3 zile.
Se administreaza oral, în apa de băut.
Dacă este necesar, se repetă tratamentul după 3 zile.
Substanţa activă: sulfadimidină sodică.
Timp de așteptare: Carne şi organe: 15 zile

5 plicuri 20 g



AMOXY-KEL 15

» Infecţii respiratorii, infecţii gastro-intestinale (colibaciloza), infecţii urogenitale, infecţii şi răni ale pielii, abcese, infecţia cu *Salmonella Dublin* la viței, mastite şi dermatite interdigitale, tonsilite, în prevenirea infecţiilor postoperatorii.
1 ml Amoxy-kel/10-20 kg greutate corporală, 1 dată/zi, timp 3-5 zile.
Se administrează pe cale intrauterină în doză de 3 - 4 ml produs medicinal veterinar.
Substanţa activă amoxicilină trihidrat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 20 zile; Lapte: 96 ore; administrare intrauterină: 1 zi.

100 ml



KELAMOXIL LA 150 MG

» Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de *Mannheimia haemolytica* şi *Pasteurella multocida*.
1 ml Kelamoxyl/10 kg greutate corporală
Administrarea trebuie repetată o dată după 48 de ore.
Substanţa activă: amoxicilină trihidrat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 18 zile; Lapte: 72 ore.

100 ml; 250 ml



CEFOKEL 50 MG/ML

» Tratamentul afecţiunilor respiratorii bacteriene asociate cu *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* şi *Histophilus somni*. Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatita infecţioasă), asociată cu *Fusobacterium necrophorum* şi *Prevotella melaninogenica (Porphyromonas asaccharolytica)*.
1 ml/50 kg greutate corporală la fiecare injecţie.
Substanţa activă: ceftiofur clorhidrat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 8 zile; Lapte: 0 ore.

100 ml



COMBI-KEL 40

» Infecţii ale tractului respirator, infecţii ale tractului uro-genital, mastite, meningite, infecţii clostridiene, tetanus, leptospiroză, actinomicoză, poliartrite şi septicemie, postoperator pentru prevenirea infecţiilor.
Bovine adulte: 12,5 ml produs/200 kg greutate corporală/zi.
Viţei: 2,5 ml produs/40 kg greutate corporală/zi
Durata tratamentului: 2 - 4 zile.
Substanţa activă: benzilpenicilină procainică, dihidrostreptomicină sulfat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 112 zile; Lapte: 4 zile (8 mulsori).

100 ml; 250 ml



PROCAPEN

» Infecţii bacteriene generale (septicemii)
Infecţii ale: sistemului respirator, aparatului urinar şi genital, pielii, ghearelor şi copitelor articulaţiilor.
0.75-1 ml/15 kg greutate corporală, timp de până la 3-7 zile.
Substanţa activă: benzilpenicilină procainică.
Timp de așteptare: Carne și organe: 14 zile pentru durata tratamentului 3 zile; 16 zile pentru durata tratamentului 4-7 zile.
Lapte: 6 zile.

100 ml



FLORFENIKEL 300 MG/ML

»Tratamentul infecțiilor tractului respirator cauzate de tulpini de *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* şi *Histophilus somni* susceptibile la florfenicol.
1 ml produs/15 kg greutate corporală, de două ori la un interval de 48 de ore, intramuscular.
Substanţa activă: florfenicol.
Timp de așteptare: Carne și organe: 34 zile;
Lapte: Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

100 ml; 250 ml



QIVITAN 25 MG/ML

»Tratamentul bolii respiratorii cauzată de *Pasteurella multocida* şi *Mannheimia haemolytica*. Dermatită digitală, necroză infecțioasă bulbară și necrobaciloză interdigitală acută (infecția piciorului). Mastită acută cauzată de *E. coli*, cu manifestări sistemice. Septicemie cauzată de E. coli la viței.
Bovine: 2 ml/50 kg greutate corporală;
Viței: 4 ml/50 kg greutate corporală.
Substanţa activă: cefquinomă sulfat.
Timp de așteptare: Carne și organe : 5 zile;
Lapte: 24 ore.

100 ml; 250 ml



TULLAVIS 100 MG/ML

»Tratamentul și metafilaxia bolilor respiratorii. Tratamentul cheratoconjunctivitei infecțioase.
1 ml/40 kg greutate corporală, o singură injecție subcutanată.
Substanţa activă: tulatromicină.
Timp de așteptare: Carne și organe : 22 zile;
Lapte: Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.
Nu se va utiliza la animale gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu cel puțin 2 luni înainte de data preconizată a parturiției.

100 ml; 250 ml



ENROTRON 100 MG/ML

»Boli ale tractului digestiv şi respirator de origine bacteriană sau micoplasmică, infecţiile bacteriene secundare ulterioare virozelor atunci când experienţa clinică indică enrofloxacina ca şi antibiotic de elecţie.
1 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3-5 zile.
Substanţa activă: enrofloxacină.
Timp de așteptare:
Carne şi organe: 5 zile; Lapte: 3 zile. - adm. iv.
Carne şi organe: 12 zile; Lapte: 4 zile. - adm. is.

100 ml



TETRAVET L.A.

»Tratamentul şi prevenirea pasteurelozelor, pneumoniilor, pleuritelor, actinobacilozelor, difteritei, necrobacilozei, abceselor infecţiilor ţesuturilor moi, mastitelor, pericarditelor, keratoconjunctivitelor; în prevenirea infecţiilor postpartum şi postoperatorii determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei.
1 ml produs/10 kg greutate corporală.
Substanţa activă: oxitetraciclină dihidrat.
Timp de așteptare: Carne şi organe: 21 zile;
Lapte: 7 zile (14 mulsori).

100 ml; 250 ml



SPIROVET

»Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de *Pasteurella multocida* și *Mannheimia haemolytica*. Tratamentul mastitei clinice acute la vaci în perioada de lactație cauzată de tulpinile de *Staphylococcus aureus* susceptibile la spiramicină.
Mastită: 5 ml produs/100 kg greutate corporală. Infecții respiratorii: 5 ml produs/30 kg greutate corporală.
Substanţa activă: spiramicină.
Timp de așteptare: Mastită: Carne şi organe: 75 zile; Lapte: 13,5 zile. Infecții respiratorii: Carne şi organe: 75 zile; Lapte: Nu este autorizată utilizarea la animalele care produc lapte pentru consum uman.

100 ml; 250 ml



MARBOX 100 MG/ML

»Tratamentul sau terapia afecțiunilor respiratorii cauzate de tulpini sensibile de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* şi *Histophilus somni*.
Tratamentul sau terapia mastitelor acute provocate de tulpinile de E.coli sensibile la marbofloxacin, în perioada de lactație.
Afecțiuni respiratorii: 2 ml soluție/25 kg greutate corporală, într-o singură injecție intramusculară.
Mastite acute: 1 ml soluție/50 kg greutate corporală, într-o singură injecție zilnică, timp de 3 zile.
Substanţa activă: marbofloxacină.
Timp de așteptare: Carne și organe: 3 zile; Lapte: 72 ore - adm. iv.
Carne şi organe: 6 zile; Lapte: 36 ore - adm. is.

1 kg



VETRIMOXIN LA

»Tratamentul infecțiilor respiratorii produse de bacterii sensibile la amoxicilină (în special Gram-pozitive și *Pasteurella spp.*).
1 ml produs/10 kg greutate corporală, de două ori, la un interval de 48 de ore; Maxim 20 ml injectați într-un singur loc.
Substanţa activă: amoxicilină trihidrat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 14 zile; Lapte: 5 mulsori.

100 ml; 250 ml

ANTIINFLAMATOARE



KETINK 300 MG/ML

» Tratamentul pentru reducerea pirexiei şi dispneei asociate cu boala respiratorie, în combinaţie cu tratamentul antiinfecţios, după caz.
1 ml produs/100 kg greutate corporală/zi, utilizare în apa de băut.
Substanţa activă: ketoprofen.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 1 zi.
500 ml



DEXAFAST 2 MG/ML

» Inducerea parturiției. Tratamentul cetozei primare (acetonemie).
Tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice: 1,5 ml/50 kg greutate corporală, utilizare intravenoasă sau intramusculară.
Tratamentul cetozei primare: 5-10 ml produs/500 kg greutate corporală.
Inducerea parturiției: 10 ml produs/500 kg greutate corporală.
Substanţa activă: dexametazonă.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 8 zile; Lapte: 72 ore.
100 ml



ANIMELOXAN

» Tratament adjuvant în infecții respiratorii acute și mastită acută la bovine, împreună cu terapia specifică. La viței peste o săptămână și tineret bovin ne-lactant, se administrează în diaree asociat rehidratării orale. Indicat pentru reducerea durerii după decornare.
2,5 ml/100 kg greutate corporală, în combinație cu tratamentul antibiotic sau cu terapia de rehidratare orală, după caz.
Substanţa activă: meloxicam.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 15 zile; Lapte: 5 zile.
100 ml



KETOPROFEN BIOVETA

» Afecțiuni inflamatorii, febră, dureri asociate infecțiilor respiratorii, mastitei acute, edemului ugerului post-partum și afecțiunilor musculo-scheletice, în asociere cu tratamentul specific atunci când este necesar.
3 ml produs/100 kg greutate corporală, o dată/zi, timp de până la 3 zile consecutive.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: după administrare intramusculară: 4 zile; după administrare intravenoasă: 1 zi; Lapte: 0 ore.
100 ml



DEXA-KEL

» Afecțiuni inflamatorii musculo-scheletice, adjuvant în bolile infecțioase acute, în reacții alergice, tulburări metabolice (cetoză), pentru inducerea parturiției și în stări de stres sau șoc.
1-2 ml produs/100 kg greutate corporală, intramuscular.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 14 zile: Lapte: 2 zile.
50 ml



KELAPROFEN 100 MG/ML

» Tratament de susținere în pareza post-partum și pentru reducerea febrei, durerii și inflamației asociate bolilor respiratorii, mastitei acute, edemului ugerului post-partum și șchiopăturii, în asociere cu tratamentul specific când este necesar.
1 ml produs/33 kg greutate corporală, o dată/zi, timp de cel mult 3 zile.
Substanţa activă: ketoprofen.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: după administrarea intravenoasă: 1 zi; după administrarea intramusculară: 2 zile. Lapte: zero ore.
50 ml; 100 ml; 250 ml

ANTIPARAZITARE



BIOMEC

» Soluție injectabilă cu ivermectină pentru tratamentul și controlul principalelor parazitoze interne și externe.
1 ml produs/50 kg greutate corporală, administrare subcutanată.
Substanţa activă: ivermectină.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 49 zile.
Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.
20 ml; 50 ml; 100 ml; 500 ml



BIMECTIN PLUS

» Tratamentul infestațiilor mixte cu trematode şi nematode sau artropode.
1 ml produs/50 kg greutate corporală.
Substanţa activă: ivermectină, clorsulon.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 66 zile; Lapte: A nu se utiliza la bovine producătoare de lapte destinat consumului uman. A nu se utiliza la vaci de lapte fără lactație, inclusiv la juninci gestante cu 60 de zile înainte de a făta.
250 ml; 500 ml



EPRECIS

» Tratamentul infestațiilor cu următorii ectoparaziți şi endoparaziți sensibili la eprinomectin: viermi rotunzi gastrointestinali, viermi pulmonari, păduchi hematofagi, muște de coarne, muște care produc noduli hipodermici, acarieni ai râiei.
0,1 ml produs/10 kg greutate corporală.
Substanţa activă: eprinomectin.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 63 zile; Lapte: zero ore.
100 ml; 250 ml



ELIVEC 5 MG/ML

» Tratamentul infestărilor cu paraziţi sensibili la eprinomectin.
1 ml produs/10 kg greutate corporală.
Substanţa activă: eprinomectin.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 15 zile; Lapte: 0 ore.
2,5 L; 1 L; 5 L



CRYPTISEL 0,5 MG/ML

» Prevenirea diareei cauzate de Cryptosporidium parvum, diagnosticată în ferme cu istoric de criptosporidioză.
2 ml produs/10 kg greutate corporală.
Substanţa activă: halofuginonă lactat.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 13 zile.
980 ml

HORMONALE



BUSOL 0,004 MG/ML

» Inducerea ovulaţiei la vaci cu un folicul dominant; sincronizarea estrului şi tratamentul chisturilor ovariene foliculare.
2,5 ml produs, administrare intramusculară.
Substanța activă: buserelin acetat.
Timp de aşteptare: Carne și organe: 0 zile; Lapte: 0 zile.
5 X 10 ml



OVARELIN

» În tratamentul sindromului căldurilor repetate.
2 ml produs/animal, într-o singură administrare
Substanța activă: gonadorelină acetat.
Timp de aşteptare: Carne și organe: 0 zile; Lapte: 0 ore.
flacon x 4ml; 10ml; 20ml; 50ml



GENESTRAN 75 MCG/ML

» Indicat pentru inducerea luteolizei și reluarea ciclului estral, sincronizarea estrului, tratamentul afecțiunilor asociate corpului luteal (subestru, tulburări uterine, chisturi ovariene luteale), inducerea avortului până în ziua 150 de gestație, expulzarea fetușilor mumifiați și inducerea parturiției.
2,0 ml (150 µg).
Substanța activă: R(+) – cloprostenol.
Timp de aşteptare: Carne și organe: 1 zi; Lapte: 0 ore.
flacon x 20 ml, 50 ml



OESTROPHAN

» Sincronizarea şi inducerea căldurilor la vaci și juninci.
2 ml produs/animal.
Substanța activă: cloprostenol.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 1 zi; Lapte: 0 zile.
flacoane x 10 ml, 50 ml; fiole x 2 ml



ENZAPROST T

» Sincronizarea estrului, inducerea parturiţiei şi avortului, tratamentul subestrului, metritelor cronice/piometrului şi sincronizarea receptoarelor în transferul de embrioni.
5 ml produs/animal, care se poate repeta dacă este necesar după 11 zile (10-12 zile).
Substanța activă: dinoprost trometamin.
Timp de aşteptare: Carne și organe: 2 zile: Lapte: 0 ore.
flacoane x 5; 10; 30; 50 ml



OXYTOCIN

» Facilitarea parturiţiei, stimularea contracţiilor uterine şi involuţiei uterului postpartum, retenţie placentară, endometrită/piometru, agalaxie, eliminarea laptelui rezidual şi adjuvant în tratamentul mastitelor.
Atonie uterină, eliminarea laptelui, mastite, involuție uterină: 20- 40 UI (i.m. sau s.c.), 2,5-10 UI (i.v.).
Substanța activă: oxitocină.
Timp de aşteptare: 0 zile.
50 ml



Sergon 1000 UI




» Tratamentul anestrului, căldurilor liniștite, inducerea şi sincronizarea estrului.
1000 - 3000 U.I./animal.
1 ml de solutie reconstituită conţine 500 UI substanţă activă.
Substanța activă: gonadotropină serică
Timp de aşteptare: 0 zile.
1000 UI liofilizat + solvent



PRID DELTA 1,55 G

» Pentru controlul ciclului sexual, inclusiv sincronizarea estrului la vacile cu activitate ovariană ciclică, precum şi inducerea şi sincronizarea estrului la vacile fără activitate ovariană ciclică.
Administrare intravaginală: 1,55 g progesteron / animal timp de 7 zile.
Substanța activă: progesteron.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 0 zile; Lapte: 0 ore.
punguţe x 1; 10 dispozitive

Foliculi mari sau anovulație

Ziua	Săptămâna 1	Săptămâna 2
Luni	Busol / Ovarelin sau  Se introduce Prid Delta 8AM 	Genestran / Oestrophan / Enzaprost 8 AM  Prid Delta (se menține) 
Marți	Prid Delta (se menține) 	Genestran / Oestrophan / Enzaprost  Prid Delta (se scoate) 8 AM 
Miercuri	Prid Delta (se menține) 	Busol / Ovarelin 16 PM 
Joi	Prid Delta (se menține) 	Inseminare Artificială 8 AM
Vineri	Prid Delta (se menține) 	
Sâmbătă	Prid Delta (se menține) 	
Duminică	Prid Delta (se menține) 	



VITAMINE



CALCIKEL 300

»Tratamentul hipocalcemiei acute şi hipomagneziemiei acute.
Bovine: 500 ml produs/animal.
Compoziție: gluconat de calciu monohidrat, clorură de magneziu hexahidrat.
Timp de așteptare: 0 zile.

500 ml



INTROVIT

»Tratamentul deficienţelor de vitamine și aminoacizi
Bovine 10-15 ml produs/animal; Viței, mânji 5-10 ml produs/animal.
Compoziție: acid folic, aminoacizi, biotină, clorură de colină, nicotinamidă, pantenol, vitamina A palmitat, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina D3, vitamina E acetat, vitamina B12.
Timp de așteptare: Carne și organe: 182 zile; Lapte: 120 ore (5 zile).

100 ml



VITOL-140

»Tratamentul deficienţelor de vitamine A, D3, E.
Bovine: 10 ml produs/animal; Viţei: 5 ml produs/animal.
Compoziție: vitamina D3, vitamina E acetat, vitamina A propionat.
Timp de așteptare: Carne și organe: 234 zile; Lapte: 120 ore (5 zile).

100 ml



VITABIS MIX

»Utilizare în fazele critice ale perioadei de creștere, în fazele de îngrășare și în toate situațiile de stres.
Vaci: 8 ml/animal/zi; Viţei: 3 ml/animal/zi.
Perioada de administrare: 5-7 zile. Tratamentul se repetă la nevoie.
Compoziție: Complex multivitaminic (A, D3, E, K3 și vitamine B) + aminoacizi esențiali.

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS AD3EC

»Suport pentru sistemul imunitar în perioadele de stres.
Vaci: 8 ml/animal/zi; Viţei: 4 ml/animal/zi.
Perioada de administrare: 5-7 zile. Tratamentul se repetă la nevoie.
Compoziție: Complex vitaminic AD3E + vitamina C (retinol, colecalciferol, alfa-tocoferol, ascorbat de sodiu).

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS E-SELENIU

»Aport deficitar de vitamina E sau Seleniu, pentru susținerea funcției reproductive sau susținere în afecțiuni ale sistemului nervos.
Vaci: 8-10 ml/animal/zi; Viţei: 3-4 ml/animal/zi.
Perioada de administrare: cel puțin 3 zile.
Compoziție: Vitamina E + Seleniu (selenit de sodiu).

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS HEPATO

»Susținerea funcției hepatice, detoxifiere.
Bovine: 20 ml/animal/zi; Viței: 3-5 ml/animal/zi.
Compoziție: betaină, colină, metionină, L-carnitină, vitamine B (B2, B12), extract de ciulin/ anghinare.
Perioada de administrare: 5-7 zile. Tratamentul se repetă la nevoie.

100 ml; 1 L; 5 L



ARTI BOOSTER

»Energizant special conceput pentru viței nou-născuți, fiind un înlocuitor de lapte complet, care asigură nutrienții esențiali pentru dezvoltarea lor în primele momente critice ale vieții.
Viței: 15 ml imediat după fătare, se poate repeta la 12 ore, dacă este necesar.
Compoziție: Colostru + vitamine + aminoacizi esențiali.

15 ml



ARTI CALCIUM

»Prevenirea deficitului de minerale la vaci după fătare.
500 ml produs/animal; administrare orală, cu 12 ore înainte de fătare, imediat după fătare, la 12 ore după fătare, la 24 ore după fătare.
Compoziție: complex de minerale (Ca, P, Mg) și oligoelemente (cobalt).

500 ml



CALCIU FURAJER VITAMINIZAT ȘI AROMATIZAT

»Suplimentarea raţiei zilnice cu calciu și vitamine.
Bovine: încorporare în furaj: 2,0–2,5 kg produs / 100 kg furaj.
Compoziție: Carbonat de calciu (min. 95%), premix vitaminic;
Aditivi senzoriali: compuși aromatizanți – Vanilină (2b05018).

6 kg; 25 kg



VITSEL E

» Prevenirea și tratamentul bolilor asociate cu deficiența de vitamina E și seleniu (mai ales distrofia musculară la animale tinere); stimulent al proceselor de reproducție.
Viței, tineret bovin:
- profilactic: 10 ml produs/100 kg greutate corporală;
- terapeutic: 20 ml produs/10 kg greutate corporală.
Vaci (cu 3 săptămâni înainte de fătare): 20 ml produs/animal.
Compoziție: alfa-tocoferol acetat, selenit de sodiu anhidru.
Timp de așteptare: Carne și organe: 30 zile; Lapte: 0 zile.
100 ml



REHYDROSOL BIO

» Previne deshidratarea și acidoza și asigură necesarul de electroliți în caz de pierderi datorate diareei provocate de diferiți agenți nutriționali, bacteriali, virali sau în caz de criptosporidioză.
Primele semne de diaree:
- Ziua 1 și 2: 4 litri de soluție pe zi = 2 x (2 l de apă + Rehydrosol Bio), administrat în 2 reprize.
- Ziua 3 și 4: 4 litri de soluție pe zi = 2 x (1 l de apă + 1 l de lapte praf + Rehydrosol Bio), administrat în 2 reprize.
Compoziție: electroliți (sodiu, potasiu, cloruri, fosfați) + agenți alcalinizanți (citrat/acetat de sodiu) + glucoză.
10 plicuri/cutie, 100 plicuri/bax



REHYD ARTIM

» Recuperarea rapidă în caz de deshidratare și dezechilibre electrolitice, în situații de risc crescut (diaree, stres de întărcare, stres termic).
Viței de lapte: a se dilua 40 ml în 2 L de lapte, de două ori pe zi, timp de două zile.
Viței sugari: a se dilua 40 ml de produs în apa de băut, de două ori pe zi, timp de două zile.
Compoziție: Dextroză, Clorură de potasiu, Clorură de sodiu, Propilen glycol.
100 ml; 5 L

TONICE DIGESTIVE



MENBUTIL 100 MG/ML

» Stimularea activității hepato-digestive în cazul tulburărilor digestive şi insuficienței hepatice.
Viţei (până la 6 luni) 1 ml produs/10 kg greutate corporală.
Bovine: 1 ml produs/15-20 kg greutate corporală.
Substanța activă: menbutona.
Timp de așteptare: carne și organe: 0 zile; Lapte: 0 zile.
100 ml



ALVEBUTON 100 MG/ML

» Stimularea activității hepato-digestive în cazul tulburărilor digestive şi insuficienței hepatice.
Viţei (până la 6 luni) 1 ml produs/10 kg greutate corporală.
Bovine: 1 ml produs/15-20 kg greutate corporală.
Substanța activă: menbutona.
Timp de așteptare: carne și organe: 0 zile;
Lapte: 0 zile.
100 ml



VIGOPHOS 100 MG/ML + 0,05 MG/ML

» Tratamentul de susținere şi prevenirea hipofosfatemiei şi/sau a deficienței de cianocobalamină (vitamina B12).
5-10 ml produs/100 kg greutate corporală.
Substanța activă: butafosfan, vitamina B12.
Timp de așteptare: carne și organe: 0 zile;
Lapte: 0 zile.
100 ml



RUCHAMAX

» Restaurarea și optimizarea funcțiilor digestive.
Vaci: 15 g produs/animal;
Juninci, viței: 5 -7 g produs/animal
Substanța activă: complex fitoterapic cu plante digestive, hepatoprotectoare și carminative.
15 g; Ruchamax 1 kg



AFANIL

» Asigură o ameliorare rapidă a timpanismului, reface flora intestinală.
Vaci: 50 ml; Juninci, viței: 25 ml.
Bovine: 1 ml produs/15-20 kg greutate corporală.
Substanța activă: emulsie lichidă pe bază de extracte din plante și uleiuri volatile carminative.
100 ml



TYMPANOL

» Emulsie lichidă împotriva timpanismului cu efect antispumant, ce acționează prin scăderea tensiunii superficiale a particulelor de gaz.
Bovine: 25 ml/3 – 5 litri de apă; Viței: 10 – 15 ml/1 -2 litri de apă.
Substanța activă: Polidimetilsiloxan activat (simeticonă).
100 ml



TOXYBIS FIX

»Decontaminarea furajelor, reduce riscul de intoxicații cu micotoxine la animale.
Se adaugă omogen în furaj de la 0.5 kg până la 2.5 kg pe tona de furaj complet, în funcție de nivelul de contaminare cu micotoxine.
Se va evita utilizarea orală simultană cu macrolidele.
Compoziție: bentonită, clinoptiolită, sepiolită, kiselgur, siliciu coloidal, drojdie de bere, alge.
25 kg



OLMIX MT.X +

»Leagă și reduce biodisponibilitatea micotoxinelor din furaje, protejează sănătatea intestinală și funcția digestivă.
Produsul va fi bine încorporat în nutreț astfel încât, în dieta finală completă, să fie respectate următoarele doze: Risc mediu-scăzut 1 g/kg ASU (Aport de Substanță Uscată)/animal/zi;
Risc mediu-crescut 1,5-2 g/kg ASU/animal/zi.
Compoziție: bentonită, kiselgur, drojdii.
25 kg



GRANIBIS POWDER

»Conservarea cerealelor, a cerealelor măcinate și a furajelor combinate.
Doza recomandată variază în funcție de tipul cerealelor, umiditatea acestora și perioada de conservare dorită.
Scade riscul de contaminare al furajelor cu microorganisme care pot afecta sănătatea bovinelor.
Compoziție: Acid propionic, acid formic din formiat de amoniu, acid formic, vermiculită , pământ de diatomee .
2.5 kg; 25 kg



FIBROZINC

»Diaree, stres de management, tulburări digestive, tranziție nutrițională.
Viței la îngrășat: 8 kg produs/t furaj.
Compoziție: Zinc sub formă de oxid de zinc, Lignoceluloză din lemn de pin.
20 kg



OLMIX DIET POWDER

»Reglarea naturală a funcțiilor digestive și a imunității la rumegătoarele tinere.
40 g/rație/50 kg corp. Timp de 1-7 zile (1-2 zile dacă sunt hrănite exclusiv cu acest produs).
Compoziție: Ulva, Spirulina, *Ascophyllum*, argilă (Bentonită), alge (extracte hidrosolubile): PSM (Polizaharide Sulfatate Marine), kieselgur (pământ de diatomee), drojdii, vitamina C, electroliți (sodiu, potasiu, clor).
2,5 kg



ESTROFARM PREMIX

»Utilizare în situații de estru nespecific, călduri silențioase, ovulație întârziată.
15 g/animal, se administrează o dată pe zi, timp de 3 zile, amestecat în furajul individual.
Compoziție: *Citrullus colocynthis, Piper longum, Piper nigrum, Zingiber officinale, Shilajit, Linnum usitatissimum, Abroma agusta.*
1 kg



BIOYEASTAR 4C

»Sursă de metaboliți rezultați din fermentarea drojdiei *Saccharomyces cerevisiae*, pentru susținerea sănătății intestinale și a funcției imunitare la bovine.
7-14 g/animal/zi
Compoziție: drojdie inactivată (*Saccharomyces cerevisiae*) cu metaboliți și alți compuși rezultați în urma fermentării lichide și solide, uscată împreună cu mediul de cultivare.
20 kg



SALCOCHECK

»Pentru prevenția și tratarea enteritei cauzate de E.coli și Salmonella; diaree sau dezechilibre digestive.
Taurine 30 g, viței: 10-15 g.
Compoziție: Light kaolin, Holarrhena antidysenterica, Aegle marmelos, Punica granatum, Woodfordia fructicosa, Barberis aristata, Acacia catechu, Plantago ovata.
15 kg



DIAROAK

»Prevenirea și controlul diareei de diferite etiologii, suport în tulburări digestive, susținerea sănătății intestinale.
Granulele se amestecă cu apă (1:5) până la omogenizare; Taurine 30 g, viței, juninci: 10-15 g. Se administrează de două ori pe zi.
Compoziție: *Caolin, Woodfordia fruticosa, Tinospora cardifolia, Polygonum aviculare, Holarrhena antidysenterica, Berberis aristata, Punica granatum, Andrographis paniculata, Cyperus rotundus, Symplocos paniculata, Acacia catechu, Zingiber officinale, Aegle marmelos, Salmalia malabarica.*
30 g; 1 kg; 15 kg



YEABIS

» Drojdie furajeră și sursă de minerale cu biodisponibilitate crescută cu rol în stabilizarea pH-ului, fixare a amoniacului și îmbunătățirea digestiei
Vaci lapte: 50-100 g produs/zi; Viței 20-50 g produs/zi
Compoziție: *Saccharomyces cerevisiae*
1 kg; 10 kg



ENERBIS PLUS

» Îmbunătățește palatabilitatea rației TMR, stimulând consumul voluntar de substanță uscată și, implicit, aportul total de nutrienți.
Rumegătoare mari: Înainte de fătare: 150 ml/animal/zi timp de 15-20 zile;
După fătare: 200-300 ml/animal/zi timp de 25-30 zile;
Până la sfârșitul lactației: 150 ml/animal/zi;
Rumegătoare mici: 25-30 ml/animal/zi.
Compoziție: glicerină, acid propionic, acid citric, glucoză, sorbat de potasiu, sulfat de cobalt.
1000 kg



BISLAC / BISLAC PREMIUM

» Înlocuitor de lapte pentru viței.
2 mese/zi; Cantitate/masă: 130 g lapte praf amestecat cu 1 litru apă.
Compoziție: *Enterococcus faecium* (probiotic) + complex de vitamine și minerale.
25 kg



BISLAC LAMB / LAMB PRO

» Înlocuitor complet de lapte pentru miei și iezi.
Miei: 200 gr pulbere + 0.820 L apă = 1L lapte reconstituit; Iezi (femele) 145 gr pulbere + 0.875 L apă = 1L lapte reconstituit; Iezi (masculi) 170 gr pulbere + 0.850 L apă = 1L lapte reconstituit.
Compoziție: Complex vitamine (A, D3, E, C, K3, B1 + oligoelemente Fe, Cu, Zn, Mn, I, Se).
25 kg



MINERAL BLOCK

» Echilibrează deficiențele de sare și minerale.
Plasați blocurile în apropierea surselor de apă, în număr suficient, pentru a preveni aglomerarea animalelor în jurul lor. Se lasă la consum ad libitum. Rata de consum inițială este mai ridicată, dar va scădea în câteva zile, după perioada de acomodare.
5 kg, 10 kg



SELCO BLOCK

» Asigurarea necesarului de vitamine şi minerale a tineretului în creştere dar şi a oilor adulte lactante.
Plasaţi blocurile în apropierea surselor de apă, în număr suficient, pentru a preveni aglomerarea animalelor în jurul lor. Se lasă la consum ad libitum. Rata de consum iniţială este mai ridicată, dar va scădea în câteva zile, după perioada de acomodare.
5 kg, 10 kg



Vitamolix Sheep & Goat

» Acces ușor și constant la vitamine, minerale, proteine și energie. Contribuie semnificativ la creșterea în greutate a mieilor de îngrășat.
Se recomandă o găleată la 40 animale.
7,5 kg



VITAMOLIX RUMINANT

» Asigură aportul energetic al animalelor și contribuie la creșterea consumului de furaje uscate. Determină creșterea numărului și activității microflorei ruminale cu 15%. Aceasta conduce la o îmbunătățire a digestiei cu peste 25%.
Aditiv furajer de înaltă calitate, bine echilibrat în proteine, vitamine, energie și minerale, pe suport de melasă.
22,5 kg, 80 kg



EUROFIT GEL

»Terapie complementară în mastite și mamite acute și subacute, pentru reducerea numerică a celulelor somatice din lapte, în cazul secrețiilor lactate sangvinolente după parturiție.
Se administrează intramamar. O seringă în fiecare sfert afectat după muls (dimineața și seara), timp de 2-3 zile.
Compoziție: *Phytolaca decandra* 30 CH, Hepat sulfur 30 CH, Bioxid de siliciu 30 Ch, *Sepia officinalis* 30 Ch, *Thuya occidentalis* 30 Ch, *Calcarea phosphorica* 30 CH, *Pulsatilla* 30 CH, Iod 30 CH, *Cantharis* 9 CH, Fosfor 9 CH, *Baptisia tinctoria* 9 CH, *Echinacea angustifolia* 9 CH, Acid azotic 9 CH, *Phellendrium aquaticum* 9 CH, *Arnica montana* 9 CH, *Bryonia* 9 CH, Alginat de sodiu 8 g, Apă 1000 ml.
30 ml



VETRAMIL

» Infuzie intramamară - calmează țesuturile inflamate şi îmbunătățește regenerarea țesutului intramamar.
Conținutul unei seringi (10ml) trebuie introdus în mamelonul fiecărui sfert afectat după muls de două ori pe zi (dimineața şi seara).
Compoziție: *Miere medicală (Mel), Thymus serpyllum* (Cimbrisor), *Lavandula angustifolia (Levantică), Melaleuca quinquenervia, Pogostemon cablin* (Patchouli-Mentă), *Ocimum basilicum (Busuioc)*, sorbitanmonooleat, vaselină albă, lanolină, ulei de soia.
10 ml



GAMARET

»Tratamentul mastitelor acute sau cronice produse de germeni patogeni sensibili la novobiocină, neomicină, benzilpenicilină, dihidrostreptomicină.
Conținutul seringii de 10 ml se introduce în sfertul afectat, bine muls în prealabil.
Substanța activă: benzilpenicilină procainică, dihidrostreptomicină sulfat, neomicină sulfat, novobiocin sodic, prednisolon.
Timp de așteptare: Carne si organe: 7 zile; Lapte: 72 ore (6 mulsori).
10 ml



LINEOMAM LC

»Tratamentul mastitei cauzate de bacterii sensibile la combinația lincomicinei și neomicinei.
Conținutul unui aplicator este administrat în fiecare sfert afectat, adică 100.000 UI neomicină sulfat şi 330 mg lincomicină. Dozele se repetă la intervale de 12 ore. În total, în fiecare sfert afectat se administreaza 3 doze.
Substanţa activă: lincomicină clorhidrat, neomicină sulfat.
Timp de așteptare: Carne şi organe: 3 zile; Lapte: 84 ore.
10 ml



INTRAMAR SEAL 2,6 G

» Prevenirea noilor infecții intramamare în perioada de repaus mamar.
Conținutul unei seringi intramamare se infuzează în fiecare sfert de uger imediat după ultimul muls din perioada de lactație (la repaus mamar).
Substanţa activă: subnitrat de bismut, greu
Timp de așteptare: Carne şi organe: 0 zile; Lapte: 0 ore.
seringa x 4 g



QIVITAN LC 75 MG

»Tratamentul mastitelor clinice la vacile aflate în perioada de lactație, provocate de următoarele organisme sensibile la cefquinomă: *Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus şi Escherichia coli.*
Conţinutul unei seringi trebuie introdus uşor în mamelonul fiecărui sfert afectat, la fiecare 12 ore, după fiecare din cele trei mulsori succesive.
Substanţa activă: cefquinomă sulfat.
seringă x 8 g



JODOUTER

»Tratamentul inflamaţiilor acute şi cronice ale mucoasei uterine: uro-vaginite, vaginite, vestibulite, cervicite, endometrite, trichomonoză,atonie uterină post partum, retenţie placentară şi piometru.
50 - 150 ml soluție în funcție de capacitatea fiziologică a vaginului. A se administra intrauterin cu un cateter.
Substanţa activă: iod povidonă.
metroinjector x 150 ml



BUJIURI SPUMANTE PINOX

»Tratamentul şi prevenirea endometritei acute puerperale, retenţiei placentare după fetotomii, cezariene şi în prevenirea proceselor inflamatorii postpartum (endometrita, piometru) produse de germeni sensibili la oxitetraciclină.
1-2 comprimate/animal la fiecare 24 de ore, timp de 3-5 zile consecutiv.
Substanţa activă: oxitetraciclină clorhidrat
Timp de așteptare: Carne şi organe: 60 zile; Lapte: 72 ore (6 mulsori).
15 kg

SPRAYURI / UNGUENTE



CHARMIL SPRAY

» Spray pentru tratarea diferitelor tipuri de afecțiuni: eczeme și dermatite, infecții bacteriene și fungice ale pielii.
Se aplică de 1-2 ori pe zi în jurul zonei afectate după ce aceasta a fost în prealabil curățată, până ce pielea este complet vindecată.
Substanța activă: ulei de cedru himalayan, ulei pongamia.
100 ml



ALUMINIUM SPRAY

» Pentru acoperirea plăgilor superficiale și protejarea acestora împotriva contaminării cu diverși agenți patogeni.
Se pulverizează un jet de Aluminium Spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, în strat subțire, de la o distanță de 20-30 cm. În caz de nevoie, tratamentul se poate repeta de mai multe ori pe zi.
Substanța activă: praf de aluminiu (micronizat).
120 ml



PROTEGO

» Pentru plăgi superficiale, plăgi post-operatorii, protecție tegumentară, cicatrizare rapidă.
Se pulverizează zilnic de 2-3 ori de la 10-20 cm distanță. Excesul de pulbere poate fi îndepărtat prin tamponare sau ștergere ușoară.
Substanța activă: oxid de zinc, stearat de calciu, ulei de oregano, ulei de mușețel, ulei de arnică, ulei de arbore de ceai, ulei de gălbenele.
400 ml



ZINKOXID SPRAY

» Pentru acoperirea plăgilor și a suprafețelor inflamate ale pielii. Are efect ușor astringent. Se poate utiliza pentru impregnarea bandajelor și protejarea pielii înainte de aplicarea bandajelor gipsate.
Se pulverizează un jet de Zinkoxid spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, de la o distanță de 20-25 cm.
Substanța activă: oxid de zinc praf.
200 ml



ARTHRO GEL

» Gel topic recomandat pentru utilizare în cazul deteriorării și inflamației articulare.
Aplicare de 1-2 ori pe zi.
Substanța activă: *Aloe barbadensis* (Aloe vera), Carbomer, Mentol, Ulei de mentă, *Rosmarinus officinalis* (Unt de rozmarin), Terpineol, Apă.
50 ml; 100 ml; 250 ml



CHARMIL GEL

» Gel pentru tratamentul rănilor și infecțiilor cutanate având proprietăți antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare, antilarvare și acaricide.
Se aplică pe pielea afectată până la vindecare.
Substanța activă: *Cedrus deodara, Azadirachta indica, Pongamia glabra.*
25 g; 50 g

SOLUȚII PENTRU UGER / DETERGENȚI SALĂ DE MULS



MASDISIN TEAT FOAM

» Îngrijirea şi curăţarea mameloanelor înainte de muls.
În recipientul special se toarnă Masdisin Teat Foam nediluat, 200 ml. Se va strânge de câteva ori recipientul cu mâna, pentru a se forma spuma, după care se imersează mameloanele în spuma formată, asigurând un timp de contact de 10-20 secunde. Se vor șterge mameloanele cu lavete (uscate sau umede), iar după masajul ugerului se va începe mulsul.
Compoziție: glicerină, acid lactic, provitamină.
20 L



MASDISIN HERBAFILM DYNAMIC

» Neutralizează în scurt timp bacteriile ce pot provoca mastită (infecţia ugerului), având proprietăţi dezinfectante cu spectru larg.
Se adaugă produsul nediluat în paharul de imersie şi se scufundă fiecare mamelon pentru câteva secunde în acest recipient.
Substanța activă: Acid Lactic (acid organic), glicerină, lanolină, extract de plante.
20 L



MASDISIN HERBAFILM IOBAR

» Protejează mamelonul și canalul mamar împotriva factorilor externi, asigurând și protecție mecanică.
Se adaugă produsul nediluat în paharul de imersie și se scufundă fiecare mamelon pentru câteva secunde în acest recipient.
Substanța activă: Iod activ, glicerină, lanolină, extract de plante.
20 L



MASDISIN HERBAFILM 4 SEASONS

» Soluţie peliculogenă pentru protecţia mameloanelor după mulgere.
Efect repelent împotriva muștelor
Se adaugă produsul nediluat în paharul de imersie şi se scufundă fiecare mamelon pentru câteva secunde în acest recipient. După uscare, pelicula formată aderă ferm de pielea mamelonului, dar este detaşabilă. A se îndepărta prin detaşare mecanică înainte de mulsoarea următoare.
Substanța activă: Acid lactic (acid organic), glicerină, lanolină, extract de plante.
20 L



OLMIX MISTRAL

» Igienizarea adăposturilor, controlul umidității, maternitate și fătare.
Boxa de fătare: 100 g / mp, de 2-3 ori pe săptămână; Cușetă: 150 g/zi/cușetă; Așternutul cu paie: 500 g/vacă, de 3 ori pe săptămână după aplicarea paielor; Grajd cu stabulație legată: 100 g/vacă în timpul mulsului; Baie uscată: o săptămână pe lună.
Compoziție: pământ de diatomee, montmorillonit, uleiuri esențiale, alge.
25 kg



CAPCANĂ ȘI LIPICI PENTRU ȘOARECI

» Combaterea rozătoarelor • capcane pentru șoareci și șobolani.
Aplicați lipiciul pe un suport (lemn, plastic, carton, etc.)
Amplasați capcana în zonele în care există activitate a rozătoarelor.
135 g



VIREX

» Dezinfectant bactericid și virucid pentru materiale, echipamente și suprafețe
Dezinfecția suprafețelor și a utilajelor prin pulverizare și aplicat 300 ml/m²;
- Diluție în apă 10°C, timp de acțiune 30 minute: Efect bactericid: soluție de lucru de 1,5% – 1,5 kg Virex la 100 litri de apă.
• Efect levuricid: soluție de lucru de 5,5% – 5,5 kg Virex la 100 litri de apă.
• Efect virucid: soluție de lucru de 1% – 1 kg Virex la 100 litri de apă.
10 kg



MURIBROM

» Pastă plic roșu - bromadiolone - Control eficient al șoarecilor și șobolanilor din adăposturi.
Doze:
Șoareci (Mus musculus):
- capcane cu momeli cu 50 g produs la fiecare 10 m²;
Șobolani (Rattus rattus):
- capcane cu momeli cu până la 200 g produs la fiecare 10 m²;
Șobolani maro (Rattus norvegicus):
- capcane cu momeli cu 100 g produs la 2 fiecare 10 m².
15 kg/cutie



MURIBROM

» Pastă plic albastru - brodifacoum - Control eficient al șoarecilor și șobolanilor din adăposturi.
DOZE: Șoareci: 50g/10mp; Șobolani negri: 50-100g/10mp; Șobolani maro: 50-100g/10mp.
150 g; 15 Kg/cutie



MASTERFLY BAIT

» Insecticid pudră pentru combaterea muștelor
- Contribuie la îmbunătățirea igienei și biosecurității în fermă.
- Controlează rapid muștele din adăposturi;
- Reduce stresul și disconfortul produs de insecte;
- Potrivit pentru utilizare în hale, țarcuri și spații tehnologice din fermele de porci;
Se prepară 100 de grame de produs cu 80 ml de apă, formând o pastă de consistență similară cu o vopsea groasă.
MASTERFLY BAIT se aplică în doze de 100 de grame de produs pentru o zonă de 100 m².
125 g; 500 g



DEZINFEX DCLR PLUS 337

» Detergent bazic spumant pentru spălarea şi degresarea suprafeţelor, utilizabil în apă caldă sau rece, datorită concentraţiei mari de hipoclorit de sodiu şi hidroxid de sodiu.
Se va folosi în concentraţie de 1-3%;
În pompele de înaltă presiune soluţia de lucru trebuie să fie sub 3%.
20 L



DEZINFEX CHLR PLUS 306

» Detergent lichid, puternic alcalin, nespumant pentru spălarea instalaţiilor CIP, dar şi a sistemelor de muls la bidon, utilizabil în apă caldă sau rece, datorită concentraţiei mari de hipoclorit de sodiu şi hidroxid de sodiu.
Se foloseşte după prespălare, diluat în apa de spălare, respectând concentraţia şi timpii de contact specificaţi în fişa de produs.
20 L



DEZINFEX ACIPLEX

» Detergent dezinfectant pe bază de acid fosforic și azotic, fără nitrați, recomandat pentru curățarea sistemelor de CIP, pentru spălarea şi igienizarea suprafeţelor metalice, inoxidabile din interioarele sistemelor de muls, a filtrelor, tancurilor de răcire, a ţevilor, şi tuturor tubulaturilor de transport al laptelui.
Poate fi utilizat în curățarea instalațiilor CIP, în diluții de 0,5-2% (w/w), în funcție de temperatura apei.
20 L

www.bistrivet.ro



dr. Albert ISZLAY
Sales Manager - Divizia Ferme
0733 959 892

dr. Attila HOSSZÚ
Key Account Manager - Moldova, Dobrogea, Muntenia Est, BV, CV, HR
0733 670 222

dr. Dragoș MEHEDINȚU
Reprezentant medical - Zona de Sud și S-E a țării
0739 653 970

Ing. Zooteh. Alexandru MOCAN
Reprezentant medical - zona Transilvania Nord, Maramureș, Crișana
0730 517 193

Ing. Zooteh. Cătălin MOATER
Reprezentant medical - jud. Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu
0738 776 347

Ing. Zooteh. Bogdan LUPU
Reprezentant medical - zona Moldova Nord
0739 922 775

Scanează pentru informații complete despre produse

Vezi catalog complet

PARTENERI ÎN SĂNĂTATEA ANIMALĂ

DISTRIBUȚIE NAȚIONALĂ

PORTOFOLIU COMPLET

CALITATE ȘI ÎNCREDERE



BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro