BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

Portofoliu SUINE

SOLUȚII VETERINARE COMPLETE
PENTRU SĂNĂTATEA ȘI PERFORMANȚA SUINELOR

PREVENȚIE
Sănătate și biosecuritate

ÎNGRIJIRE
Suport pentru bunăstare și performanță

TRATAMENT
Soluții eficiente, confirmate în ferme de creștere



VACCINURI • ANTIBIOTICE • ANTIINFLAMATOARE • ANTIPARAZITARE

HORMONALE • VITAMINE • INTRAUTERINE • TONICE DIGESTIVE

ADITIVI FURAJERI • POSTBIOTICE • SPRAYURI / UNGUENTE • MANAGEMENT ȘI SECURITATE



BIOSUIS ENTERO

- Protecție împotriva *E. coli • Rotavirus porcin • Cl. Perfringens tip C*
- Instalarea imunității:
- *E.coli* la 12 ore de la fătare
- *Cl perfringes* la 2 zile după fătare
- *Rotavirus* la 5 zile dupa fătare
- Durata imunității: până la 3 săptămâni.

50 ml - 25 doze



PARVOERYSIN

- Protecție împotriva *Parvovirusului porcin • Erysipelothrix rhusiopathiae*
- Instalarea imunității: la 3 săptămâni
- Durata imunității: 6 luni după prima vaccinare

100 ml - 25 doze; 50 ml - 25 doze



BIOSUIS LEPTO P

- Protecție împotriva *Leptospira spp. • Parvovirus suis*
- Instalarea imunității: la 3 săptămâni
- Durata imunității: 6 luni după prima vaccinare

50 ml - 25 doze



POLYPLEUROSIN APX PLUS IM

- Protecție împotriva *Actinobacillus pleuropneumoniae • Pasteurella multocida • Bordetella bronchiseptica*

Instalarea imunității: la 2 săptămâni după revaccinare

- Durata imunității: la purcei proveniți din scroafe vaccinate: 2-3 săptămâni
- După revaccinare: până la 6 luni

100 ml; 250 ml



ROKOVAC NEO

- Protecție împotriva *E. coli • Rotavirus porcin*
- Instalarea imunității: *E.coli* la 12 ore de la fătare, *Rotavirus* la 5 zile după fătare

50 ml; 100 ml; 250 ml



BIOSUIS APP 2,9,11

- Protecție împotriva *Actinobacillus pleuropneumoniae • Serovarurile 2, 9, 11*
- Instalarea imunității: la 3 saptămâni după rapel
- Durata imunității: până la 20 de săptămâni de la rapel

50 ml - 25 doze; 100 ml - 100 doze



SER CLOSTETAN

- Protecție împotriva *Tetanosului*
- Serul administrat profilactic oferă imunitate pasivă pentru 7 - 10 zile.

20 ml; 100 ml



PORCILIS GLASSER

- Protecție împotriva *Glaesserella parasuis*
- Instalarea imunității: la 2 săptămâni de la finalizarea protocolului
  - Purcei: imediat după ingestia colostrului
- Durata imunității: 14 săptămâni de la finalizarea protocolului
  - Purcei: 4-6 săptămâni

50 ml; 100 ml; 250 ml



PORCILIS PCV/ID

- Protecție împotriva *Circovirus porcin tip 2*
- Instalarea imunității: la 2 săptămâni
- Durata imunității: până la 24 săptămâni

100 ml



PORCILIS M. HYO

- Protecție împotriva *M. hyopneumoniae- tulpina 11*
- Instalarea imunității: la 2 săptămâni de la rapel
- Durata imunității: cel putin 20 de săptămâni de la rapel

10 ml - 50 doze



PORCILIS LAWSONIA/ID

Protecție împotriva *Lawsonia intracellularis*
Instalarea imunității: la 4 săptămâni
Durata imunității: până la 21 săptămâni

10 ml - 50 doze



PORCILIS PCV M. HYO

- Protecție împotriva *Circovirus porcin tip 2* • *Mycoplasma hyopneumoniae J inactivată*
- Instalarea imunității:
PCV2 – la 2 săptămâni după vaccinare (18 zile după **I**-a vaccinare – schema cu 2 doze);
M. hyo – la 4 săptămâni după vaccinare (3 săptămâni după a **II**-a vaccinare)
- Durata imunității: *PCV2* – 22 săptămâni; *M. hyo* – 21 săptămâni după ultima vaccinare
- Protocol de vaccinare: schemă cu doză unică sau 2 doze, în funcție de strategia fermei.

10 ml - 50 doze; 20 ml - 100 doze



PORCILIS PRRS

- Protecție împotriva *Virusului PRRS*
- Debutul imunității: la 28 zile post-vaccinare.
- Durata imunității: cel puțin 24 săptămâni.

50 doze; 100 doze



PORCILLIS BEGONIA

- Protecție împotriva *Aujeszky (Pseudorabia)*
- Instalarea imunității: la 3 săptămâni
- Durata imunității: până la 4 luni

100 ml; 250 ml

ANTIBIOTICE



AMOXYCILLIN KELA 700 MG/G 1 KG

»Infecții respiratorii, gastro-intestinale, poliartrite, erizipel și MMA
1 ml/10-20 kg greutate corporală, administrare intramusculară
Timp de așteptare: carne și organe: 46 zile
1 kg



ALPHAFLOROSOL 100 MG/ML

»*Afecțiuni respiratorii ale porcilor asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida.* Tratamentul bolii *Glässer* provocate de *Haemophilus parasuis*
10 ml produs/100 kg greutate corporală, utilizare în apa de băut
Timp de așteptare: carne şi organe: 23 zile
1 L



COLFIVE 5.000.000 UI/ML

»Infecţii enterice cauzate de tulpinile de *E. coli* neinvazive, susceptibile la colistin sulfat
100.000 UI colistin sulfat per kg greutate corporală pe zi, timp de 3-5 zile consecutive, concentrat pentru soluţie orală
Timp de așteptare: carne şi organe: 1 zi
1 L



DOXINYL 500 MG/G

» Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de *Mycoplasma hyopneumoniae* și *Pasteurella multocida*
40 mg/kg greutate corporală, utilizare în apa de băut.
Timp de așteptare: carne şi organe: 4 zile
1 kg



SULFADIMIDIN Bioveta

»Tratamentul *Coccidiozelor*
1 plic (20 g)/10 litri de apă, timp de 3 zile, utilizare în apa de băut.
Timp de așteptare: carne şi organe: 15 zile
5 plicuri 20 g



TYLOSIN 75%

» Infecțiile tractului gastrointestinal şi ale tractului respirator
1 g/10 kg greutate corporală/zi, utilizare în apa de băut.
Timp de așteptare: 12 zile
1 kg



AMOXY-KEL 15

»Infecţii respiratorii, infecţii gastro-intestinale (colibaciloza), infecţii urogenitale, infecţii şi răni ale pielii, abcese, poliartrite, erizipel şi MMA tonsilite, în prevenirea infecţiilor postoperatorii.
1 ml Amoxy-kel 15% / 10-20 kg greutate corporală 1 dată/zi, timp 3-5 zile.
Timp de așteptare: carne și organe: 46 zile
100 ml



CEFOKEL 50 MG/ML

» Afecțiuni respiratorii asociate cu *Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis*
1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie
Timp de așteptare: carne și organe: 5 zile
100 ml



COMBI-KEL 40

»Infecții ale tractului respirator, infecţii ale tractului uro-genital, mastite, meningite, rujet, infecții clostridiene, tetanus, leptospiroză, poliartrite şi septicemie.
Purcei: 0,25 ml/4 kg greutate corporală/zi, timp de 1-4 zile
Timp de așteptare: carne și organe: 116 zile
100 ml



PROCAPEN

»Infecţii ale tractului uro-genital (*Streptococcus spp. beta-hemolitic*), sistemului locomotor (infecții cu *Streptococcus suis*), pielii (infecţii cu *Erysipelotrix rhusiopathiae*)
1 ml/15 kg greutate corporală, timp de până la 3-7 zile
Timp de așteptare: carne și organe: 14 zile pentru durata tratamentului 3 zile; 16 zile pentru durata tratamentului 4-7 zile
100 ml



ENROTRON 100 MG/ML

»Tratamentul infecțiilor cauzate de *Pasteurella multocida, Mycoplasma spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella spp., SDP (sindromul MMA)*
0,5 ml/20 kg greutate corporală, 1 dată/zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile
Timp de așteptare: carne și organe: 13 zile
100 ml



FLORFENIKEL 300 MG/ML

»Tratamentul în focarele de boli respiratorii acute la porci, cauzate de tulpini precum *Actinobacillus pleuropneumonie, Pasteurella multocida*
1 ml/20 kg greutate corporală, de două ori la un interval de 48 de ore, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe: 18 zile
100 ml; 250 ml



MARBOX 100 MG/ML

»Tratamentul sindromului *MMA*
1 ml/50 kg greutate corporală, într-o singură injecție intramusculară, timp de 3 zile
Timp de așteptare: carne și organe: 4 zile
1 kg



TETRAVET L.A.

»Tratamentul şi prevenirea pneumoniilor, pleuritelor, sindromului MMA, rujetului, mastitelor, omfalitelor, rinitei atrofice, abceselor, infecţiei ţesuturilor moi, infecțiilor postpartum şi postoperatorii.
20 mg/kg greutate corporală
Timp de așteptare: carne și organe: 21 zile
100 ml; 250 ml



VETRIMOXIN LA

»*Infecții respiratorii produse de bacterii sensibile la amoxicilină (în special Gram-pozitive și Pasteurella spp.)*
1 ml/10 kg greutate corporală, de două ori, la un interval de 48 de ore; volumul maxim pe locul de injectare: 6 ml
Timp de așteptare: carne și organe: 16 zile
100 ml; 250 ml



SPECTAM

»*Infecții digestive şi respiratorii produse de micoplasme, salmonele, colibacili, pasteurele*
Suine: 10-20 ml/100 kg greutate corporală; purcei sugari: 0,5 ml/animal
Timp de așteptare: carne și organe: 5 zile
100 ml



KELAMOXIL LA

»Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de *Pasteurella multocida*
1 ml/10 kg greutate corporală, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe : 20 zile
100 ml; 250 ml



QIVITAN

»Pentru tratamentul infecțiilor bacteriene cauzate de *Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis, Staphylococcus spp., E. coli*
2 ml/25 kg greutate corporală, intramuscular, frecvența în funcție de afecțiune
Timp de așteptare: carne și organe : 3 zile
100 ml; 250 ml



TULLAVIS

»Tratamentul şi metafilaxia bolilor respiratorii ale porcilor (BRS) asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica*
1 ml/40 kg greutate corporală, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe : 13 zile
100 ml; 250 ml

ANTIINFLAMATOARE



ANIMELOXAN

»Tulburările locomotorii ne-infecțioase, pentru a reduce simptomele de şchiopătură şi inflamație. Terapie adjuvantă în tratamentul septicemiei puerperale, sindrom *MMA*
2,0 ml/100 kg greutate corporală, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe: 8 zile
100 ml



DEXAFAST

» Tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice.
1,5 ml/50 kg greutate corporală, utilizare intravenoasă sau intramusculară
Timp de așteptare: carne și organe: 2 zile după administrarea intramusculară; 6 zile după administrarea intravenoasă
100 ml



KETINK

»Tratament pentru reducerea pirexiei şi dispneei asociate cu boala respiratorie, în combinație cu tratamentul antiinfecțios, după caz
0,5 - 1 ml/100 kg greutate corporală/zi, utilizare în apa de băut
Timp de așteptare: carne și organe: 1 zi
500 ml



KETOPROFEN BIOVETA

»Afecțiuni inflamatorii, febrile și dureroase asociate *MMA* și bolilor respiratorii
1 ml/33 kg greutate corporală, o dată/zi, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe: 2 zile
100 ml



DEXA-KEL

»Antiinflamator, antialergic
1-2,5 ml/10 kg greutate corporală, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe: 14 zile
50 ml



KELAPROFEN

»Reducerea pirexiei şi frecvenței respiratorii ridicate asociate bolilor respiratorii bacteriene sau *virale, tratament de susținere în sindromul MMA*
1 ml/33 kg greutate corporală, o dată/zi, timp de cel mult 3 zile, intramuscular
Timp de așteptare: carne și organe: 2 zile
50 ml; 100 ml; 250 ml

ANTIPARAZITARE



ESPACOX 5%

»Prevenirea semnelor clinice de coccidioză la purceii nou-născuți (cu vârsta cuprinsă între 3 - 5 zile) cauzată de *Cystoisospora suis (Isospora suis)*
0,4 ml suspensie orală/kg greutate corporală, suspensie orală.
Timp de așteptare: carne și organe: 73 zile
250 ml; 1L



BIOMEC

»Soluție injectabilă cu ivermectină pentru tratamentul principalelor parazitoze interne și externe.
1 ml/33 kg greutate corporală, administrare subcutanată
Timp de așteptare: carne și organe: 28 zile
20 ml; 50 ml; 100 ml; 500 ml

HORMONALE



SUIFERTIL 4 MG/ML

»*Sincronizarea estrului la scroafele mature nulipare*

5 ml animal o dată pe zi timp de 18 zile consecutive

Timp de așteptare: carne și organe: 9 zile

1000 ml



GENESTRAN 75 MCG/ML

»*Inducerea şi sincronizarea parturiției*

0,7- 1,0 ml (52,5-75 µg). Se va administra în doză unică.

Timp de așteptare: carne și organe: 1 zi

20 ml



OESTROPHAN

»*Inducerea parturiției la scroafe*

0,7 ml produs / animal, începând din ziua 111-a de gestație. Parturiția se produce în cel mult 40 de ore după administrare, cu un maxim de efect la 24-35 ore

Timp de așteptare: carne și organe: 1 zi

10 x 2 ml; 10 ml; 50 ml



OXYTOCIN BIOVETA

»*Facilitarea parturiției şi pentru accelerarea fazei de expulzie*

Atonie uterină, involuție uterină, retenție placentară, eliminarea laptelui: 10 - 30 UI (i.m. sau s.c.), 0,5 -2,5 UI (i.v.)

Timp de așteptare: 0 zile

50 ml



SERGON 1000 UI

»*Tratamentul anestrului, căldurilor liniştite, inducerea şi sincronizarea estrului şi creşterea numărului de purcei la scroafe.*

500 - 1000 U.I./ animal, intramuscular sau subcutanat

Timp de așteptare: 0 zile

10 ml liofilizat + 2 ml solvent



SERGON PG 400+200 UI

»*Tratamentul anestrului, inducerea estrului, sincronizarea gestației la scroafe și la scrofițe.*

o doză (2 ml) înapoia urechii, intramuscular sau subcutanat.

Declanşarea estrului are loc la 3-6 zile după administrare.

Timp de așteptare: carne și organe: 0 zile

1 doză liofilizat + 2 ml solvent

VITAMINE



INTROVIT

»Tratamentul deficienţelor de vitamine și aminoacizi

2-10 ml produs/animal

Timp de așteptare: carne și organe: 166 zile

100 ml



VITSEL E

»*Prevenirea şi tratamentul bolilor asociate cu deficiența de vitamină E și seleniu*

Purcei:

- profilactic: 1 ml produs/10 kg greutate corporală
- terapeutic: 2 ml produs/10 kg greutate corporală

Timp de așteptare: carne și organe: 30 zile

50 ml; 100 ml



ARTIPIG

»*Energizant pentru purceii nou-născuți*

2 ml / purcel imediat după parturiție, cu repetare 5 ore mai târziu. Repetare în a doua zi de viață.

Purceii subponderali vor primi doze duble

250 ml



ESPERMAPLUS

»*Aportul optim al micronutrienților esențiali, vitaminelor și aminoacizilor necesari pentru a maximiza producția de spermă la vierii cu potențial genetic ridicat.*

30 grame* produs/kg furaj

*Tratament minim de la o săptămână pe lună

3 kg; 25 kg



VITABIS MIX

»*Utilizare în fazele critice ale perioadei de creștere, în fazele de întărcare și în toate situațiile de stres*

1,2 ml/animal/zi în furajul complementar.

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS HEPATO

»*Susținerea funcției hepatice, detoxifiere*

Scroafe/Porci la îngrășat: 0.75-2 l/1000 l apă de băut; Purcei: 2-3 ml/1 l apă de băut

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS AD3EC

» Suport pentru sistemul imunitar în perioadele *de stres*

Porci/Purcei: 10 ml/100 l apă de băut în furajul complementar.

100 ml; 1 L; 5 L



VITABIS E-SELENIU

» *Aport deficitar de vitamina E sau Seleniu, pentru susținerea funcției reproductive sau susținere în afecțiuni ale sistemului nervos*

25 ml - 50 ml/100 l apă de băut în furajul complementar.

100 ml; 1 L; 5 L



CALCIBIS PLUS

» *Aport rapid de calciu și microelemente esențiale*

Purcei: 1ml/L apă de băut, timp de 3-5 zile;
Scroafe: 13 ml/100 kg greutate corporală, timp de 3 zile după fătare

100 ml; 1 L; 5 L

INTRAUTERINE



JODOUTER

» *Igienă uterină, infecții reproductive, recuperare postpartum*

Spălarea vaginului cu 150 ml de produs sau mai mult.
Spălarea terapeutică trebuie efectuată în 12 ore de la fătare.
Sterilitatea, ca şi consecinţă a infecţiilor subacute - administrarea a 300 ml de produs.
Tratamentul consecutiv se poate efectua în aceeaşi doză.

150 ml



BUJIURI SPUMANTE PINOX

» *Administrare intrauterină, în tratamentul şi prevenirea endometritei acute puerperale, infecții și inflamații uterine postpartum, retenție placentară, recuperare reproductivă*

1 comprimat/animal la fiecare 24 de ore, timp de 3-5 zile consecutiv.
Administrarea profilactică se va face imediat după fătare, doza se poate repeta la 24 de ore (dacă este necesar).
Timp de așteptare: carne și organe: 60 de zile

40 comprimate/cutie

TONICE DIGESTIVE



MENBUTIL 100 MG/ML

» *Stimularea activității hepato-digestive în cazul tulburărilor digestive şi insuficienței hepatice*

1 ml soluție injectabilă / 10 kg greutate corporală, administrare intramusculară profundă sau intravenoasă lentă
Timp de așteptare: carne și organe: 0 zile

100 ml

ADITIVI FURAJERI



TOXYBIS FIX

» *Decontaminarea furajelor,* reduce riscul de intoxicații cu micotoxine la animale

Se adaugă omogen în furaj de la 0.5 kg până la 2.5 kg pe tona de furaj complet, în funcție de nivelul de contaminare cu micotoxine.
Se va evita utilizarea orală simultană cu macrolidele

25 kg



OLMIX MT.X +

» Leagă și reduce biodisponibilitatea micotoxinelor din furaje, protejează sănătatea intestinală și funcția digestivă

Produsul va fi bine încorporat în nutreț astfel încât, în dieta finală completă, să fie respectate următoarele doze: Scroafe și purcei 1 kg/tonă; Porci pentru îngrășat 0,5 kg/tonă

25 kg



ACIBIS FIX

» *Acidifierea furajului și inhibarea micotoxinelor*
La purcei scade incidența bolii edemelor și cea a diareilor metabolice apărute la înțărcare și la schimbarea furajului

Purcei: 1 kg/100 kg furaj; Scroafe, porci la îngrășat: 0,8 kg/100 kg furaj

1.5 kg; 10 kg



GRANIBIS POWDER

» *Conservarea cerealelor, a cerealelor măcinate și a furajelor combinate.*
Doza recomandată variază în funcție de tipul cerealelor, umiditatea acestora și perioada de conservare dorită.
Scade riscul de contaminare al furajelor cu microorganisme care pot afecta sănătatea porcilor
2.5 kg; 25 kg



ACIBIS LIQUID 4

» *Perioade critice (întărcare, stres, creștere, tranziții de furajare)*
În apa de băut: 0,3-1,5 kg/t (doza depinde de calitatea apei, este recomandată obținerea unui pH de 4,5)
În furaj: Purcei: 4-6 kg/t; Scroafe, porci la îngrășat: 3-4 kg/t
210 kg; 1000 kg



ACIBIS LIQUID 5

» *Perioade critice (întărcare, stres, creștere, tranziții de furajare)*
În apa de băut: 0,3-1,5 kg/t (doza depinde de calitatea apei, este recomandată obținerea unui pH de 4,5)
În furaj: Purcei: 4-6 kg/t; Scroafe, porci la îngrășat: 3-4 kg/t
210 kg; 1000 kg



ACIBIS POWDER

» *Acidifierea furajului*
Purcei: 2-5 kg/t furaj; Scroafe, porci la îngrășat: 1,5-4 kg/t furaj
25 kg



ARBOCEL RC FINE

» *Tulburări intestinale, peristaltism intestinal, diaree de întărcare, aport de fibre*
A se utiliza în concentrație de 0,5 % - 6 % în funcție de aplicabilitate
20 kg;



FIBROZINC

» *Diaree, stres de management, tulburări digestive, tranziție nutrițională*
Scroafe, purcei: 10 kg FibroZinc/t furaj
20 kg



ESTROFARM PREMIX

» *Utilizare în situații de estru nespecific, călduri silențioase, ovulație întârziată.*
10 g / animal, se administrează o dată pe zi, timp de 3 zile, amestecat în furajul individual.
1 kg



RESPIREX MINT

» *Susținerea sănătății respiratorii, în cazul apetitului scăzut, a infecțiilor bacteriene și virale, precum și în caz de stres termic*
200 ml / 1000 L apă de băut, timp de 3-4 zile.
1 L



DAN MILK

» Supreme & Complete: Înlocuitor de lapte pentru purcei
Suplimentarea hranei în perioada de alăptare și post-întărcare
130-140 g de produs / L de apă
20 kg



ENERGY BOOZT

» *Profilaxia anemiei la purcei, suport în perioada neonatală și de întărcare*
Piglet Boozt poate fi utilizat în apa de băut sau în sistemul de dozare Pump'n'Grow.
Apă: 0,5 - 2 %; Dozare: 50 ml: Se adaugă 50 ml/kg DanMilk Supreme - se utilizează în sistemul Pump'n'Grow.
25 L



BISLAC FEED

» *Furaj complementar pentru purcei, cu o formulă pe bază de ingrediente lactate și nutrienți esențiali, atent echilibrată pentru a susține creșterea lentă (fără depuneri excesive de grăsime) a animalelor*
Rata de încorporare în furaj: Purcei: 20–25%
20 L



OLMIX SEAGUT PASTA 120 ML

» *Tulburări digestive neonatale, deshidratare, pierdere de electroliți și/sau energie*
Purcei: 1 doză de 2 ml / purcel / zi, administrat timp de 1-2 zile
120 ml



DIAROAK

Prevenirea și controlul diareei de diferite etiologii, suport în tulburări digestive, susținerea sănătății intestinale

Granulele se amestecă cu apă (1:5) până la omogenizare.

30 g; 1 kg; 15 kg



SALCOCHECK

Pentru prevenția și tratarea enteritei cauzate de E.coli și Salmonella; diaree sau dezechilibre digestive

Se administrează timp de 5-7 zile

Profilactic: până la 60 kg: 1 - 1,5 kg/t furaj peste 60 kg: 1 - 1,2 lg/t furaj

Terapeutic: la toate categoriile: 1,5 - 2 kg/t furaj

15 kg



YEABIS

Drojdie furajeră și sursă de minerale cu biodisponibilitate crescută cu rol în stabilizarea pH-ului, fixare a amoniacului și îmbunătățirea digestiei

Purcei înțărcați: 5 kg/t furaj; Scroafe: 11 kg/t furaj

1 kg; 10 kg

POSTBIOTICE



BIOYEASTAR 4C

Postbiotic dezvoltat special pentru a susține sănătatea animalelor, obținut cu ajutorul tehnologiei brevetate de fermentare a drojdiei SA-10 (Saccharomyces cerevisiae).

Potrivit pentru toate tehnologiile de furajare

Purcei în maternitate: starter/tranziție 1-2 kg/tonă; Creștere/Finisare porci: 0.5-1 kg/tonă; Scroafe gestante/în lactație 1-2 kg/tonă

20 kg

SPRAYURI / UNGUENTE



CHARMIL SPRAY

Spray pentru tratarea diferitelor tipuri de afecțiuni: eczeme și dermatite, infecții bacteriene și fungice ale pielii

Se aplică de 1-2 ori pe zi în jurul zonei afectate după ce aceasta a fost în prealabil curățată, până ce pielea este complet vindecată.

100 ml



ALUMINIUM SPRAY

Pentru acoperirea plăgilor superficiale și protejarea acestora împotriva contaminării cu diverși agenți patogeni

Se pulverizează un jet de Aluminium Spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, în strat subțire, de la o distanță de 20-30 cm. În caz de nevoie, tratamentul se poate repeta de mai multe ori pe zi.

120 ml



PROTEGO

Pentru plăgi superficiale, plăgi post-operatorii, protecție tegumentară, cicatrizare rapidă

Se pulverizează zilnic de 2-3 ori de la 10-20 cm distanță. Excesul de pulbere poate fi îndepărtat prin tamponare sau ștergere ușoară.

400 ml



ZINKOXID SPRAY

Pentru acoperirea plăgilor și a suprafețelor inflamate ale pielii. Are efect ușor astringent. Se poate utiliza pentru impregnarea bandajelor și protejarea pielii înainte de aplicarea bandajelor gipsate.

Se pulverizează un jet de Zinkoxid spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, de la o distanță de 20-25 cm.

200 ml



SPRAY AMAR

Spray cu gust amar, previne mușcarea și linsul rănilor sau pansamentelor

Se pulverizează pe suprafața care trebuie protejată de la o distanță de 20-30 cm.

100 ml



ARTHRO GEL

Gel topic recomandat pentru utilizare în cazul deteriorării și inflamației articulare

Aplicare de 1-2 ori pe zi.

50 ml; 100 ml; 250 ml



CHARMIL GEL

Gel pentru tratamentul rănilor și infecțiilor cutanate având proprietăți antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare, antilarvare și acaricide

Se aplică pe pielea afectată până la vindecare

25 g; 50 g



ARBOCEL R

» *Reducerea umidității în adăposturi, uscarea purceilor nou-fătați*

Imediat după fătare, purceii se scufundă într-un recipient cu ARBOCEL R – produsul trebuie să ajungă pe tot corpul.
Pentru scăderea umidității în adăposturi, se recomandă utilizarea a 40 g/m², dar doza depinde de conținutul de umiditate al suprafeței care trebuie uscată.

20 kg



OLMIX MISTRAL

» *Igienizarea adăposturilor, controlul umidității, maternitate și fătare*

Scroafe gestante și vieri: 65 g/mp/animal, de 3 ori pe săptămână sau la nevoie;
Unitate de fătare: 1-2 kg/litru împrăștiate în toată boxa zilnic, acordând o atenție deosebită în partea din spate a boxei;
La naștere: scufundați purcelul în Mistral;
Unitățile de îngrijire și îngrășare: 300-500 g/mp, de 2 ori pe săptămână.

25 kg



DEZINFEX ACIPLEX

» *Recomandat pentru curățarea sistemelor de CIP, pentru spălarea şi igienizarea suprafeţelor metalice, inoxidabile din interioarele sistemelor de muls, a filtrelor, tancurilor de răcire, a ţevilor, şi tuturor tubulaturilor de transport al laptelui*

Poate fi utilizat în curățarea instalațiilor CIP, în diluții de 0,5-2% (w/w), în funcție de temperatura apei.

20 L



DEZINFEX DCLR PLUS 337

» *Spălarea şi degresarea suprafeţelor, utilizabil în apă caldă sau rece, datorită concentraţiei mari de hipoclorit de sodiu şi hidroxid de sodiu*

Se va folosi în concentraţie de 1-3%;
În pompele de înaltă presiune soluţia de lucru trebuie să fie sub 3%

20 L



DEZINFEX CHLR PLUS 306

» *Spălarea instalaţiilor CIP, dar şi a sistemelor de muls la bidon, utilizabil în apă caldă sau rece, datorită concentraţiei mari de hipoclorit de sodiu şi hidroxid de sodiu*

Se foloseşte după prespălare, diluat în apa de spălare, respectând concentraţia şi timpii de contact specificaţi în fişa de produs

20 L



VIREX

» Dezinfectant pe bază de peroxizi pentru suprafețe, echipamente și sisteme de apă

Dezinfecția suprafețelor și a utilajelor prin aspersare: diluat 1:300 și aplicat 300 ml/m;
DEFRA a testat și aprobat produsul pentru următoarele diluții :
Febra Aftoasă: 1 parte VIREX în 1300 părți apă.
Boala Veziculoasă a Porcului: 1 parte VIREX la 200 părți apă.
Salmonelloza: 1 parte VIREX la 100 părți apă.

10 kg



CAPCANĂ ȘI LIPICI PENTRU ȘOARECI

» *Combaterea rozătoarelor • capcane pentru șoareci și șobolani*

Aplicați lipiciul pe un suport (lemn, plastic, carton, etc.)
Amplasați capcana în zonele în care există activitate a rozătoarelor

135 g



MURIBROM

» ***Pastă plic albastru - brodifacoum - Control eficient al șoarecilor și șobolanilor din adăposturi***

DOZE: Șoareci: 50 g/10 mp; Șobolani negri: 50-100 g/10 mp; Șobolani maro: 50-100 g/10 mp

150 g; 15 Kg/cutie



MURIBROM

» ***Pastă plic roșu - bromadiolone - Control eficient al șoarecilor și șobolanilor din adăposturi din adăposturi***

Doze: Șoareci (Mus musculus): capcane cu momeli cu 50 gr. produs la fiecare 10 m²; Șobolani (Rattus rattus): capcane cu momeli cu până la 200 gr. produs la fiecare 10 m²; Șobolani maro (Rattus norvegicus): capcane cu momeli cu 100 gr. produs la 2 fiecare 10 m²

15 kg/cutie



MASTERFLY BAIT

Insecticid pudră pentru combaterea muștelor

- Contribuie la îmbunătățirea igienei și biosecurității în fermă
- Controlează rapid muștele din adăposturi
- Reduce stresul și disconfortul produs de insecte
- Potrivit pentru utilizare în hale, țarcuri și spații tehnologice din fermele de porci

Se prepară 100 de grame de produs cu 80 ml de apă, formând o pastă de consistență similară cu o vopsea groasă;
MASTERFLY BAIT se aplică în doze de 100 de grame de produs pentru o zonă de 100 m²
125 g; 500 g

---

dr. Albert ISZLAY
Sales Manager - Divizia Ferme
0733 959 892

dr. Attila HOSSZÚ
Key Account Manager - Moldova, Dobrogea, Muntenia Est, BV, CV, HR
0733 670 222

dr. Dragoș MEHEDINȚU
Reprezentant medical - Zona de Sud și S-E a țării
0739 653 970

Ing. Zooteh. Alexandru MOCAN
Reprezentant medical - zona Transilvania Nord, Maramureș, Crișana
0730 517 193

Ing. Zooteh. Cătălin MOATER
Reprezentant medical - jud. Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu
0738 776 347

Ing. Zooteh. Bogdan LUPU
Reprezentant medical - zona Moldova Nord
0739 922 775

Scanează pentru informații complete despre produse

Vezi catalog complet

PARTENERI ÎN SĂNĂTATEA ANIMALĂ

DISTRIBUȚIE NAȚIONALĂ

PORTOFOLIU COMPLET

CALITATE ȘI ÎNCREDERE



BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro