



CATALOG PRODUSE ANIMALE DE FERMĂ PĂSĂRI



BistriVet

Everything for vets and farms

www.bistrivet.ro



1 ANTIBIOTICE

AMOXICILLIN 70%	3
ALPHAFLOROSOL	3
COLFIVE	3
ENROCIN	4
DOXINYL	4
TYLOSIN	4

2 ANTIPARAZITARE

DERMANYGUARD	5
LEVOPLIX 10%	5

3 ADITIVI FURAJERI

VITABIS E-SELENIU	6
VITABIS HEPATO	6
CALCIBIS PLUS	7
VITABIS MIX	7
VITABIS AD3EC	7
ARBOCEL R	8
ARBOCEL RC FINE	8
BIOYEASTAR 4C	9
OVO-STIM IMUNO	10
RESPIREX MINT	11
SALCOCHEK	11
DIAROAK	11
SEARUP STILL UE	12
ACIBIS LIQUID 4	12
ACIBIS LIQUID 5	12
ACIBIS POWDER	13
GRANIBIS LIQUID	13
GRANIBIS POWDER	14
TOXYBIS FIX	15
MT.X+	15

4 MANAGEMENT ȘI BIOSECURITATE

Z'FIX SLURRY	16
MISTRAL	16
ALIZE	16
NONAN DEZINFECTANT	17
DEZINFEX DCLR PLUS 337	17
DEZINFEX CHLR PLUS 306	17
DEZINFEX ACIPLEX	18
DEZINFEX FACID	18
VIREX	19
PEROXAN FORTE	19
MURIBROM ALBASTRU/ROȘU	20
MURIBROM 150G	21
CAPCANĂ ȘI LIPICI PENTRU ȘOARECI	21
MASTERFLY BAIT	22

5 ECHIPAMENTE ZOOTEHNICE/ CONSUMABILE / INSTRUMENTAR

DOZATOARE MIXRITE	23
SERINGĂ AUTOMATĂ 1, 2, 3, 5 ML	24
SERINGĂ AUTOMATĂ A METALICĂ 0,1-2 ML FURTUN	24
SERINGĂ AUTOMATĂ B METALICĂ 0,1-1 ML FURTUN	24
SERINGĂ AUTOMATĂ B METALICĂ 0,1-2 ML FURTUN	25
SERINGĂ AUTOMATĂ K PISTOL 2 ML FURTUN	25
HSW SERINGĂ PLEXIGLAS TU-FLEX-MASTER	25
HSW SERINGĂ AUTOMATĂ ECO-MATIC	26
HSW SERINGĂ AUTOMATĂ ECO-MATIC CU FURTUN	26
HSW SERINGĂ AUTOMATĂ MULTI-MATIC	26
MEDX COVOR DEZINFECȚIE	27
FOARFECE MEDX	27
MĂNUȘI	27
SCAFĂ ALUMINIU	27
BONETE BUFANTE	27
BOTOȘEI CHIRURGICALI	27

Catalogul BistriVet pentru animale de fermă - păsări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest catalog fără a anunța în prealabil.

Produsele și informațiile din acest document pot face obiectul unor modificări și/sau variații în ceea ce privește textele și ambalajele prezentate.

Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele și descrierile prezentate în catalog.



AMOXYCILLIN 70% 1 kg

**Substanță activă:**

Amoxicilină trihidrat 817,70 mg/g
(echivalent la 700 mg amoxicilină)

Indicații:

Prevenirea și tratamentul infecțiilor cauzate de tulpini ale *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp. și *Escherichia coli*

Administrare:

20 mg/kg greutate corporală pe zi, timp de 5 zile

Cantitatea necesară pentru 1000 litri apă de băut poate fi calculată astfel:
 $20 \text{ mg/kg} \times \text{media GV (kg)} \times \text{nr. de animale}$

----- = Y gram/1000 L

Cantitatea totală de apă consumată pe zi, în litri

Timp de așteptare: Carne: 1 zi



ALPHAFLOSOL 100 mg/ml 1 L

**Substanță activă:**

Florfenicol 100 mg/ml

Indicații:

Tratamentul infecțiilor cauzate de tulpini ale: *Chlamydia* spp., *E. Coli*, *Pasteurella* spp., *Mycoplasma* spp.

Administrare:

0,2 ml produs/kg greutate corporală/zi timp de 5 zile.

$0,2 \text{ ml/kg} \times \text{Greutatea corporală medie (kg)}$

----- = Y ml produs/litru de apă de băut

consum zilnic mediu de apă (L)/animal

Timp de așteptare: Carne și organe: 8 zile



COLFIVE 1 L

**Substanță activă:**

Colistin sulfat 5.000.000 UI/ml

Indicații:

Tratamentul infecțiilor gastrointestinale cauzate de tulpinile *E. coli*

Administrare:

15 ml/tonă greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile

$0,015 \text{ ml} \times \text{greutate corporală medie (kg)}$

----- = ml de produs/litru de apă de băut

Consumul zilnic mediu de apă (L)/animal

Timp de așteptare: Carne și organe: 1 zi, ouă: 0 zile



ENROCIN 10% 1 L

Substanță activă:

Enrofloxacin 100,0 mg/ml

Indicații:

Tratamentul infecțiilor respiratorii, intestinale și sistemice cauzate de: *E. coli*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma synoviae*, *Salmonella* spp., *Pasteurella multocida*, *Bordetella avium*, *Haemophilus paragallinarum*, *Avibacterium paragallinarum*.

Administrare:

10 mg enrofloxacină/kg greutate corporală timp de 3-5 zile

Nr. total de păsări x Greutatea corporală medie în kg x 0,1 = Volum total (ml) pe zi

Timp de așteptare: Carne și organe: găini și curcani: 3 zile.



DOXINYL 500 mg/g 1 kg



Substanță activă:

Doxiciclină hclat (echivalent cu 500 mg doxiciclină bază) 577 mg

Indicații:

Broileri: tratamentul bolilor cronice respiratorii cauzate de *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*

Curcani: tratamentul bolilor respiratorii și articulare cauzate de *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*

Administrare:

Broileri: 40 mg/kg greutate corporală

Curcani: 50 mg/kg greutate corporală

Administrare timp de 5 zile

Timp de așteptare: Carne și organe: broileri 4 zile; curcani: 12 zile



TYLOSIN 75% 1 kg



Substanță activă:

Tilozină tartrate 750 000 U.I. (825 mg)

Indicații:

Prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii cronice (C.R.D.) produse de *Mycoplasma gallisepticum*, la puii de găină și curcani.

Adjuvant în tratamentul sinuzitelor infecțioase la curcani.

Administrare:

Doza: 100 g produs/150 litri apă de băut

Timp de administrare:

- pentru prevenirea B.R.C. a puilor de 1 zi: 3 zile consecutive;

- repetați tratamentul după aproximativ 4 săptămâni pentru 1 sau 2 zile

- tratamentul B.R.C: 2 până la 5 zile

- adjuvant în tratamentul sinuzitei infecțioase (curcani): 2 până la 5 zile

Timp de așteptare: Carne și organe: pui de găină: 1 zi; curcani: 5 zile.



DERMANYGUARD

5 L, 1 L, 100 ml

**Compoziție:**

Apă purificată prin osmoză inversă, clorură de sodiu, clorură de magneziu, zahăr bio caramelizat.

Substanțe aromatice: Cimbru (*Thymus Vulgaris*), Vetrice (*Tanacetum vulgare*), etanol

Indicații:

Reducerea populațiilor de acarieni (*Dermanyssus gallinae*), astfel că, este indicat ca acest tratament să se aplice preventiv, pentru a menține populația acarienilor sub control.

Administare:

1 ml/L apă de băut, timp de 7-10 zile pe lună, la toate păsările din gospodărie.

Administrarea ulterioară depinde de gradul de infestație:

- ușoară sau medie: se continuă cu o administrare pe lună (la fiecare 4 săptămâni), până la sfârșitul perioadei de producție
- masivă: se continuă cu 2 administrări pe lună (la fiecare 2 săptămâni) pe o perioadă de 3 luni. După aceste 3 luni se continuă cu o singură administrare pe lună până la sfârșitul perioadei de producție.

LEVOPLIX 10%

20g

Pulbere orală

Compoziție:

Fiecare g conține:

Substanțe active: 100 mg levamisol clorhidrat.

Indicații:

Se recomandă la găini în tratamentul infestațiilor cu nematode în diferite stadii adulte și larvare: *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Marsallagia marshalli*, *Neoscaris vitulorum*, *Oesophagostomum spp.*, *Thelazia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Chabertia ovina*, *Dictyocaulus filaria*, *Ostertagia circumcincta*, *Ostertagia ostertagi*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Hyostrongylus rubidus*, *Globocephalus ursubulatus*, *Stephanurus dentatus*.

Administare:

Se administrează pe cale orală, în apa de băut, în următoarele doze:

La găini: 36-48 mg levamisol clorhidrat/kg g.c

În caz de infestații cu *Syngamus*, tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile.

La puii de găină: 1 mg levamisol clorhidrat/50 kg g.c., după vaccinarea împotriva bolilor de Newcastle sau Marek, timp de 3 zile începând din ziua vaccinării.

**Timp de așteptare:**

Carne și organe: 28 zile



VITABIS E-SELENIU

5 L, 1 L, 100 ml

**Compoziție:**

Vitamine: Vitamina E

Oligoelemente: Seleniu/Selenit de sodiu

Antioxidanți: Hidroxianisol butilat (BHA), Galat de propil.

Indicații:

Se recomandă în situații de aport deficitar de Vitamina E sau Seleniu, pentru susținerea funcției reproductive, ca tratament de susținere în afecțiuni ale sistemului nervos și în situații de stres.

Administrație:

250 ml - 500 ml/1000 L apă de băut, timp de cel puțin 3 zile



VITABIS HEPATO

5 L, 1 L, 100 ml

Compoziție:

Vitamine: Vitamina B2 / Riboflavină 5'-monofosfat sare de sodiu, Vitamina B12 / cianocobalamină, L- carnitină, Betaină anhidră, Clorură de colină.

Aminoacizi, sărurile și analogii lor: Analog hidroxilat al metioninei, DL-metionină, tehnic pură; Proteină brută, grăsime brută, fibre brute, cenușă brută, sodiu, lizină, metionină.

Indicații:

Produsul contribuie la detoxifierea întregului organism prin eliminarea toxinelor, a micotoxinelor și a metalelor grele acumulate în ficat sau rinichi și împiedică procesul de degenerescență a ficatului.

Administrație:

1-2 L/1000 L apă de băut, timp de 5-7 zile





CALCIBIS PLUS 5 L, 1 L, 100 ml



Compoziție:

Macro și microelemente: Calciu, Fosfor, Magneziu, Cupru, Mangan, Zinc.

Indicații:

CalciBis Plus este recomandat a se utiliza în perioadele de risc care implică mobilizarea calciului sistemic. Aceste perioade coincid cu zilele premergătoare parturii și a demarării lactației.

Administrare:

Găini ouătoare: 1 L/1000 L apă de băut, timp de 5 zile

Pui broiler: 1 L/1000 L apă de băut, timp de 3-5 zile

VITABIS MIX 5 L, 1 L, 100 ml



Compoziție:

Vitamine: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Niacinamidă, D-Pantenol.

Aminoacizi: Cistină, Treonină, Triptofan, Glicină, Acid Glutamic, Arginină, Alanină, Acid Aspartic, Fenilalanină, Isoleucină, Leucină, Valină, Tirozină, L-Histidină, Prolină, Serină.

Indicații:

Se recomandă utilizarea în fazele critice ale perioadei de creștere și în toate situațiile de stres.

Administrare:

300 ml/1000 L apă de băut, timp de 5-7 zile

VITABIS AD3EC 5 L, 1 L, 100 ml



Compoziție:

1,2 propandiol, sorbitol, citrat de sodiu

Vitamine: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E

Antioxidanți: Ascorbat de sodiu, Hidroxianisol butilat (BHA), Galat de propil.

Indicații:

Complexul de vitamine A, D3 și E este esențial în susținerea organismului animalelor în perioadele de reproducție, lactație, tulburări metabolice sau în diferite afecțiuni.

Administrare:

100 ml/1000 L apă de băut timp de 5-7 zile



ARBOCEL R 20 Kg



Compoziție:

Lignoceluloză pură

Referințe generale:

Lignocelulozele ARBOCEL R sunt obținute din lemn de molid netratat, selectat și uscat cu grijă. ARBOCEL R este utilizat în compuşii furajelor, în principal pentru îmbogățirea fibrelor brute. Datorită capacității sale de expansiune, dozajul recomandat este cuprins între 0,5 % și 6 %, în funcție de aplicație. Poate fi amestecat cu furaje umede sau uscate.

Utilizare:

Pentru scăderea umidității în adăposturi, se recomandă utilizarea a 40 g/m², dar doza depinde de conținutul de umiditate al suprafeței care trebuie uscată.



ARBOCEL RC FINE 20 kg



Substanță activă:

Concentrat unic din fibră brută fibrilată HPC, insolubil

Indicații:

- optimizează digestibilitatea
- crește rata pasajului intestinal
- creează o rețea de fibre în tractul intestinal, crescând eficiența enzimelor în procesul de digestie
- îmbunătățește digestibilitatea proteinelor și a grăsimilor
- optimizează rata de conversie și sporul mediu zilnic
- este puțin fermentabil
- stimulează vilii intestinali
- crește conținutul de substanță uscată al fecalelor
- previne canibalismul

Administrare:

Arbocel RC Fine datorită capacității crescute de expandare și umflare este recomandat a se utiliza în concentrație de 0,5 % - 6 % în funcție de aplicabilitate.





BIOYEASTAR 4C

Postbiotic special dezvoltat pentru a susține sănătatea intestinală
și imunitatea animalelor de producție



Compoziție:

Cultură de drojdie (*Saccharomyces cerevisiae*) obținută prin procesul de fermentare, incluzând fermentarea lichidă și solidă, uscată împreună cu mediul de cultivare.

Indicații:

Bioyeastar 4C se utilizează în compoziția furajului pentru păsări.
Este un produs postbiotic dezvoltat special pentru a susține sănătatea animalelor pe baza unei tehnologii unice în domeniul microbiomului.

Administrare:

Broiler/Curci

Starter 1-1.5 kg/tonă furaj

Creștere/Finisare 0.5-1 kg/tonă furaj

Furaje pentru ouătoare


Starter puici 1-1.5 kg/tonă furaj

Creștere puici 1-1.5 kg/tonă furaj

Ciclul de ouat (toate fazele) 1-1.5 kg/tonă furaj

Furaje pentru păsări de reproducție

În toate etapele vieții 1-1.5 kg/tonă furaj



Formula de acțiune Bioyeastar 4C are un efect semnificativ asupra tractului digestiv al animalelor:

- ✓ Echilibrează sistemul imunitar și ajută la menținerea sănătății intestinale
- ✓ Crește producția de anticorpi
- ✓ Are acțiune antioxidantă
- ✓ Stimulează creșterea bacteriilor benefice, datorită prezenței prebioticelor
- ✓ Crește dimensiunea și densitatea vilozităților intestinale
- ✓ Îmbunătățește digestibilitatea nutrienților

BIOYEASTAR[®] 4C

**Postbioticele: Soluția inovatoare în sprijinul
imunității și sănătății intestinale**





OVO-STIM IMUNO

Stimulent pentru ouat
- Furaj complementar -



Descriere:

Este un amestec de calciu, fosfor, sodiu, microelemente, aminoacizi și vitamine, echilibrat pentru a satisface nevoile fiziologice la păsări (găini, găște, rațe, curcani, păsuni, porumbei etc.).

Ovo-stim imuno conține toată cantitatea de microelemente și vitamine necesară obținerii de performanțe bune în producție de ouă.

Conține Bioyaster 4c, un produs postbiotic dezvoltat special pentru a susține sănătatea animalelor, pe baza unei tehnologii unice în domeniul microbiomului.

Mai mult de 50% din conținutul de calciu din ovo-stim imuno are ca sursă DeBaas. DeBaas este produs din coloniile de corali formate de o algă marină calcaroasă cu un conținut ridicat de minerale și oligoelemente cu o biodisponibilitate ridicată, cum ar fi calciu (30%) și magneziu (5.5%). Aceste caracteristici duc la o eliberare controlată și pe termen lung de calciu și magneziu, într-un interval larg de pH. Prin urmare, DeBaas este o sursă eficientă de calciu și magneziu, cu o activitate biologică excelentă.

Compoziție:

Constituenți analitici: Calciu, Magneziu, Sodiu, Fosfor, Iod, Seleniu, Fier, Mangan, Cupru, Zinc, Potasiu, Sulf, Metionină, Lizină, Acid nicotinic, Acid pantotenic, Acid folic, Biotină, Colină, Glicină, Cisteină, Histidină, Fenilalanină.

Aditivi: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, E 161g Cantaxatin, Fixator micotoxine

Indicații:

Se recomandă păsărilor crescute în sistem gospodăresc, în perioada de ouat și în perioada de pregătire pentru ouat. Ovo-stim imuno este indicat pentru:

- Stimularea producției de ouă
- Corectarea nivelului de calciu, vitamine și microelemente
- Menținerea stării de sănătate și creșterea imunității

Administrare:

Produsul se administrează în amestec cu uruială după cum urmează: 1 kg stimulent pentru ouat Ovo-stim imuno la 9 kg uruială cereale.

**STIMULENT
PENTRU
OUAT**





RESPIREX MINT 1 L

Soluție orală cu efect expectorant



Compoziție:

Amestec de uleiuri și extracte naturale de mentă, eucalipt și anason

Indicații:

Respirex Mint are efect expectorant, decongestionant și de revitalizare a membranelor mucoasei respiratorii. De asemenea uleiurile naturale combat infecțiile bacteriene, virale și ameliorează simptomele cauzate de condițiile de stres.

Scopul utilizării:

- Pentru a obține un efect antiviral, antibacterian și antimicotic natural (cu uleiuri esențiale);
- Uleiul de eucalipt ajută în mod natural la protecția epiteliului sistemului respirator și ajută la îndepărtarea excesului de mucus din bronhii; are efect expectorant și mucolitic;
- Mentolul are efect anestezic și relaxant. Menta și uleiul de cimbru au fost adăugate în Respirex Mint pentru îmbunătățirea respirației, apetitului, funcției digestive și efectului carminativ;
- Aplicarea spray-ului cu aerosoli are efect reconfortant în caz de temperaturi ridicate.
- Utilizați cu două zile înainte și două zile după vaccinare.

Administrare:

200 ml pentru 1000 L apă de băut. Folosiți timp de 3 - 4 zile

În cazul pulverizării, doza recomandată este de 0,03 - 0,1 ml Respirex la 1 kg greutate corporală pasăre.

SALCOCHEK

1 kg, 15 kg



Antidiareic și modulator al funcției intestinale

Compoziție:

Light kaolin, *Holarrhena antidysenterica*, *Aegle marmelos*, *Punica granatum*, *Woodfordia fruticosa*, *Barberis aristata*, *Acacia catechu*, *Plantago ovata*

Indicații:

- pentru a preveni și trata enterita cauzată de *E.coli* și *Salmonella*
- diaree de origine specifică și nespecifică
- corectarea sindromului de malabsorbție
- în perioadele de risc din producție, ca de exemplu: în caz de boală, perioada vaccinărilor, transferului sau schimbarea furajului

Administrare:

Profilactic: 0,5 - 1 kg/t furaj timp de 5 - 7 zile

Terapeutic: 1 - 1,5 kg/t furaj timp de 5 - 7 zile

DIAROAK

30 gr, 1 kg, 15 kg

Premix poliherbal antidiareic



Compoziție:

Caolin, *Tinospora cardifolia*, *Holarrhena antidysenterica*, *Punica granatum*, *Cyperus rotundus*, *Acacia catechu*, *Aegle marmelos*, *Woodfordia fruticosa*, *Polygonum aviculare*, *Barberis aristata*, *Andrographis paniculata*, *Symplocos paniculata*, *Zingiber officinale*, *Salmalia malabarica*

Indicații:

Ajută la regenerarea și regularizarea funcționării întregului sistem digestiv, astfel prevenind și controlând diareea de diferite etiologii (ex. schimbarea furajului, furaj umed sau poluat, infecții).

Previne pierderea de apă și de nutrienți, crește funcționarea adecvată a sistemului digestiv, intensifică raportul de conversie al furajului, absoarbe și neutralizează toxinele din tractul intestinal, reface stratul de mucus din stratul gastrointestinal, atrage organismele patogene.

Administrare:

1 - 3 kg/t furaj



SEARUP STILL UE 5 L

Soluție orală pentru stimularea imunității



Compoziție:

Alge (extracte hidrosolubile): MSP (polizaharide sulfatate marine), vitamine (A, D3, E, complexul B), aminoacizi, acizi grași, vitamine și minerale prezente în mod natural în algele selecționate

Indicații:

- stres
- infecții
- parazitoze
- managementul vaccinării

Administrare:

În apa de băut: 0,5 ml până la 1 ml/L/zi în funcție de stadiul fiziologic; sau 0,5 ml până la 1 ml/10 kg greutate corporală/zi. Utilizați timp de 3 până la 5 zile.

ACIBIS LIQUID 4 30 kg, 210 kg, 1000 kg



Acidifiant lichid

Compoziție:

Acid formic, acid lactic, acid propionic, acid citric, glicerină, propilen glicol

Indicații:

Furaj complementar pe bază de acizi organici
Amestec lichid concentrat de acizi organici pentru acidifierea furajului și a apei de băut.

Administrare:

În apa de băut: 0,3 - 1,5 kg/1000 L (doza depinde de calitatea apei, este recomandată obținerea unui pH de 4,5)
În furaj: 3 - 4 kg/1000 L



ACIBIS LIQUID 5 30 kg, 210 kg, 1000 kg



Acidifiant lichid

Compoziție:

Acid formic, acid lactic, acid propionic, acid citric, acid sorbic, glicerină, propilen glicol

Indicații:

Furaj complementar pe bază de acizi organici
Amestec lichid concentrat de acizi organici pentru acidifierea furajului și a apei de băut.

Administrare:

În apa de băut: 0,3 - 1,5 kg/1000 L (doza depinde de calitatea apei, este recomandată obținerea unui pH de 4,5)
În furaj: 3 - 4 kg/1000 L





ACIBIS POWDER

25 kg

Acidifiant pulbere

**Compoziție:**

Acid formic, format de amoniu, glicerină, propilen glicol

Carrier: Vermiculită, pământ de diatomee purificat, acid silicic precipitat și uscat.**Indicații:**

Furaj complementar pe bază de acizi organici.

Amestec granulat cu conținut ridicat de acid formic și format de amoniu pentru acidifierea furajului.

Administrare:

Doze: 2-4 Kg/tonă furaj

GRANIBIS LIQUID

1000 L

Conservant pentru cereale

**Compoziție:**

Acid propionic, propionat de amoniu, acid benzoic.


Indicații:

Furaj complementar pe bază de acizi organici.

Amestec lichid de acizi organici pentru conservarea furajelor și a cerealelor.

Administrare:

Tipul cerealelor și procentul de umiditate (%)	Durata conservării			
	Doza minimă (L / t cereale)			
Grâu, ovăz, orz, triticales, secară, porumb	Până la o lună	1 - 3 luni	3 - 6 luni	6 - 12 luni
12	1,0	1,5	2,0	2,5
14	2,0	2,5	3,0	3,5
16	3,0	4,0	5,0	5,5
18	4,0	5,0	6,0	7,0
20	4,5	6,0	7,0	8,0
22	5,0	7,0	8,0	9,0
24	5,5	7,5	9,0	10,0
Porumb boabe însilozat				
Până la 35	11,0	12,0	13,0	15,0
Până la 40	12,0	14,0	15,0	18,0
Până la 45	15,0	16,0	17,0	20,0
Porumb boabe măcinat, CCM, LKS, furaj combinat	3 - 5			





GRANIBIS POWDER

2,5 KG, 25 KG

BistriVet
Everything for vets and farms



Amestec granulat de acizi organici cu conținut de acid propionic, acid formic din formiat de amoniu și acid formic.

Compoziție:

Aditivi mg/kg:

Aditivi conservanți:

Acid propionic (1k280) 442.000 mg

Acid formic din formiat de amoniu (1a295) 72.900 mg

Acid formic (1k236) 50.240 mg

Aditivi tehnologici:

Vermiculită (E561) 250.000 mg

Pământ de diatomee (E551c) 150.000 mg

Instrucțiuni de utilizare:

Tipul cerealelor și procentul de umiditate [%]	Durata conservării Doza minima [kg / t cereale]			
Porumb , grâu, ovăz, orz, triticale, secară	Până la o lună	1–3 luni	3–6 luni	6–12 luni
12	1,5	2	2,5	3,5
14	2,5	3,0	3,5	4,5
16	3,5	4,5	5,5	6,5
18	4,5	5,5	7,0	8,0
20	5,0	7,0	8,0	9,0
22	5,5	8,0	9,0	10,0
24	6,0	8,5	10,0	11,5
Porumb boabe însilozat umed				
Până la 35	11,5	13,0	14,5	16,0
Până la 40	12,5	15,0	16,5	19,0
Până la 45	15,5	17,0	18,0	21,0
Porumb boabe măcinat, CCM, LKS, furaj combinat	4-6			

**ASIGURĂ CONSERVAREA OPTIMĂ A MATERILOR PRIME ȘI A FURAJELOR,
ASIGURÂND ÎN ACELAȘI TIMP O NUTRIȚIE ADECVATĂ
PENTRU OBTINEREA UNOR PERFORMANȚE SPORITE**





TOXYBIS FIX 25 KG



Inhibitor de micotoxine utilizat pentru decontaminarea furajelor



Compoziție:

Bentonită, Clinoptilolită, Sepiolită, Kieselgur, Siliciu coloidal, Drojdie de bere, Produse din drojdie, Făină de alge marine, Alge (Ulva spp., Solieria chordalis)

Leagă și neutralizează cele mai periculoase micotoxine din hrană:

- Aflatoxina B1
- Ochratoxina A
- Zearalenonă
- Deoxinivalenol (DON)*

*DON este o micotoxină mare – necesită adsorbanti speciali pentru a fi neutralizată!

Adsorbanti naturali și siguri:

- Bentonită - Adsorbant puternic pentru aflatoxine și zearalenonă
- Clinoptilolită - Captează aflatoxine, fumonisine și DON
- Sepiolită - Eficientă în legarea zearalenonei și DON
- Kiesegur - Sprijină detoxifierea și sănătatea intestinală
- Drojdie de bere, alge marine și produse din drojdie - Surse naturale de β -glucani cu capacitate de legare pentru DON și OTA

Indicații:

- Leagă micotoxinele în tractul digestiv
- Sprijină regenerarea hepatică și susține imunitatea
- Crește performanța animalelor
- Digestie mai bună, randament crescut la hrană
- Ajută la prevenirea scăderii în greutate, fertilității, producției de lapte/ouă
- Mai puține costuri legate de tratamente și mortalitate

Administrare:

Se adaugă omogen în furaj de la 0.5 kg până la 2.5 kg pe tona de furaj complet, în funcție de nivelul de contaminare cu micotoxine. Se va evita utilizarea orală simultană cu macrolidele. Pentru păsări: se va evita utilizarea simultană cu robenidina.

MT.X+ 25 kg Captator de micotoxine



Compoziție:

- Montmorillonit micronizat cu structură stratificată
- Diatomit
- Pereți celulari de drojdie
- Ingrediente stimulatoare ale imunității: extracte de alge

Indicații:

Combinația dintre montmorillonit și anumite extracte de alge mărește spațiul dintre straturile de montmorillonit (x10) și totodată, îl face funcțional: crește suprafața adsorbantă accesibilă, crește numărul locurilor de adsorbție și formează mai multe tipuri de locuri de adsorbție rezultând astfel un spectru larg de adsorbție.

Structura unică a produsului MT.X+ permite captarea nu numai a toxinelor mici, planare (aflatoxinele), ci și a toxinelor cu o structură complexă (zearalenonele, fumonisinele și trichotecenele).

Administrare:

Micotoxicoză subacută:

Broileri < 20 zile: 1 kg/t
Broileri > 20 zile: 0,5 kg/t
Găini ouătoare: 0,5 - 1 kg/t
Găini reproducătoare: 1 kg/t
Rațe și curci: 1 kg/t

Micotoxicoză acută:

Broileri < 20 zile: 1,5 - 2 kg/t
Broileri > 20 zile: 1,5 - 2 kg/t
Găini ouătoare: 1,5 - 2 kg/t
Găini reproducătoare: 1,5 - 2 kg/t
Rațe și curci: 1,5 - 2 kg/t



Z'FIX SLURRY 25 kg



Compoziție:

Ingrediente ECO (Cu, Fe, Zn, Mn...)

Matrice: carbonați de calciu și magneziu

Indicații:

Utilizarea regulată a Z'fix® Slurry reduce emisiile de amoniac și păstrează fracția organică conținută în suspensie.

Avantaje: atmosferă mai bună în clădiri, o suspensie mai omogenă și, prin urmare, mai fluidă și, în cele din urmă, valori de fertilizare optimizate la împrăștiere pentru un impact pozitiv asupra solurilor și plantelor.

Administrare:

Broileri, găini ouătoare, claponi, bibilici, prepelițe, porumbei: 120 kg/400 m² după amplasarea așternutului

Curcani: 150 kg/400 m² în două sau trei aplicații



MISTRAL 25 kg



Pulbere pentru absorbția umidității

Compoziție:

Pământ de diatomacee, montmorillonit, uleiuri esențiale, alge

Indicații:

- îmbunătățirea igienei
- îmbunătățirea mediului ambiant

Administrare:

Curci: 100 g/mp/săptămână, din prima zi până în săptămâna 12

Pui Broiler: 100 g/mp/săptămână, din prima zi până în săptămâna 5

Rațe: 50 g/mp, o dată la două zile de la clocire



ALIZE 25 kg



Pulbere pentru absorbția umidității

Compoziție:

Absorbanți minerali, absorbanți vegetali, uleiuri esențiale

Indicații:

- igienizare prin uscarea mediului ambiant
- igiena pardoselii și a așternutului

Administrare:

Păsări: 150 g/m²/săptămână din prima zi până la săptămâna 12

Pui broiler: 150 g/m²/săptămână din prima zi până la săptămâna 5

Rațe pe așternut de paie: 75 g/m², o dată la două zile începând din prima zi



NONAN DEZINFECTANT

25 L

Soluție dezinfectantă pentru uz zootehnic.

Compoziție:

Clorura de didecil dimetil amoniu 100 mg, Glutaraldehidă 50 mg, Aromatizant mentolat, coloranți și excipienți q.s.

Indicații:

Dezinfectant bactericid, levuricid și virucid pentru uz zootehnic. Dezinfectarea suprafețelor, pardoselilor, pereților, plafoanelor, echipamentelor, picioarelor (băi de picioare) și culoarelor din zonele în care sunt adăpostite, ținute sau transportate animale.

Doza și modul de aplicare:

Se prepară soluția de lucru prin diluarea concentratului cu apă. Nivelul de diluare depinde de spectrul dorit și durata de acțiune.

- Suprafețe: stropire sau pulverizare manuală/mecanică (1L soluție / 10 m²).
- Baie de picioare: imersie (50 ml produs / 1 L apă). Reînnoiți soluția la fiecare 48 de ore.
- Termonebulizare: 1 L produs + 3 L apă pentru dezinfecția unui spațiu de 1000 m³.

A se aplica în absența animalelor. A se aplica cu 24 de ore înainte de popularea hălelor cu animale.



DEZINFEX DCLR PLUS 337

5 L, 20 L

Detergent bazic spumant



Compoziție:

Hipoclorit de sodiu < 15%, hidroxid de sodiu < 15%, surfactanți spumogeni, protectori ai suprafețelor și agenți de chelatare pentru păstrarea eficienței în apa dură. Nu conține nitrați sau fosfați. pH: 12 - 13

Indicații:

Spălarea și igienizarea spațiilor publice, a spațiilor de creștere (pereți și echipamente) din fermele zootehnice, a țevelor și a oricăror alte echipamente unde utilizarea unui detergent spumogen este necesară.

Administrare:

Dezinfex DCLR 337 se va folosi în concentrație de 1 - 3%. În pompele de înaltă presiune soluția de lucru trebuie să fie sub 3%. Se recomandă aplicarea cu pistoale de spumă prin pulverizarea pe suprafețe și asigurarea unui timp de acționare de min. 10 - 15 minute. Folosirea apei calde (cca. 60°C) sporește viteza de acțiune și asigură rezultate optime.



DEZINFEX CHLR PLUS 306

5 L, 20 L

Detergent bazic nespumant



Compoziție:

Hipoclorit de sodiu < 40%, hidroxid de sodiu < 25%, surfactanți, protectori ai suprafețelor și agenți de chelatare pentru păstrarea eficienței în apa dură

Utilizare:

Dezinfex CHLR 306 se folosește după prespălare, diluat în apa de spălare, respectând concentrația și timpii de contact specificați în tabel:

Spălare cu apă caldă			
Stadiul spălării	Temperatura apei (°C)	Timp de contact (min.)	Diluție (%)
Prespălare	40-50	10	0.5
Spălare	50-60	10-15	
Clătire	Apă rece	10	
Spălare cu apă rece			
Prespălare	Apă rece	10	1
Spălare	50-60	10-20	
Clătire	Apă rece	10	

Indicații:

Spălarea și igienizarea echipamentelor



DEZINFEX ACIPLEX 20 L



Detergent dezinfectant utilizat pentru îndepărtarea petelor de calcar

**Compoziție:**

Acid fosforic 5 ± 2 %

Acid nitric 35 ± 2 %

Indicații:

Este recomandat pentru spălarea și igienizarea suprafețelor metalice, inoxidabile.

Este util împotriva depunerilor de calcar, proteine, minerale și diferite săruri.

Aplicabilitate:

Se utilizează în diluții de 0,5-2% (w/w), în funcție de temperatura apei.

Faze ale spălării: Pre-clătire - Spălare cu Dezinfex Aciplex - Clătire finală

Depinzând de tipul de aplicare, curățarea trebuie făcută cu Dezinfex Aciplex timp de 10 – 15 minute la 50-70°C.

DEZINFEX FACID 333 5L, 20 L



Detergent acid spumant

**Compoziție:**

Acid fosforic < 40%, surfactanți spumogeni, protectori ai suprafețelor și agenți de chelatare pentru păstrarea eficienței în apa dură. Nu conține acid azotic. pH: 1 - 2

Indicații:

Spălarea și igienizarea suprafețelor metalice, inoxidabile, a țevelor

Administrare:

Detergent Dezinfex Facid 333 se va folosi uzual în concentrație de 5%. Se recomandă aplicarea cu pistoale de spumă prin pulverizarea pe suprafețe și asigurarea unui timp de acțiune de 10 - 15 minute.



VIREX 10 L

Dezinfectant



Compoziție:

Perozimonompersulfat 50%

Indicații:

Boala lui Aujeszky, tenosinovita, PCV2, enterita parvovirală, infecții cu *Bacillus*, *Helicobacter*, *Streptococcus*, *Campylobacter*, *Listeria*, *Vibrio*, *Clostridium*, *Proteus*, *Candida*, *Enterococcus*, *Pseudomonas*, *Dermatophilus*, *E.coli*, *Salmonella*, *Microsporum*, *Haemophilus*, *Staphylococcus*, *Trichophyton*.

Administrare:

În dezinfecția terminală.

Dezinfecția suprafețelor și utilajelor prin aspersare: 1:300 și aplicați 300 ml/m²

Termonebulizare în combinație cu soluție de glicoli.

Doza recomandată: 800 g/1000 mc

Dezinfecția coloanelor de apă în perioada efectuării dezinfecției terminale.

Pentru dezinfecția apei de băut cu animalele în hală, folosiți diluția 1:1000

Dezinfectant rutier și filtru sanitar: rata de diluție: 1:100

PEROXAN FORTE 24 kg

Dezinfectant



Compoziție:

Acid paracetic 15%, acid acetic 15%, peroxid de hidrogen stabilizat 23,8 %

Indicații:

Spectru larg de activitate, ce acționează rapid. Pentru dezinfecția terminală a halelor. Poate fi folosit pentru tratarea apei.

Concentrații uzuale recomandate:

Suprafețe și echipamente:

1 parte PEROXAN la 200 părți apă (1:200) aplicat prin aspersare. Consum specific din soluția diluată, 300 ml/m²

Ceață rece:

1 parte PEROXAN la 10 litri apă (1:10) și aplicați cu aparatul de ceață, rata de aplicare 15 ml/m³

Dezinfecția sistemului de apă și a apei:

1 la 5 părți PEROXAN până la 100 părți apă (1:100 până la 1:20). Inundați complet coloanele de apă, lăsați pentru 3-6 ore, apoi clătiți coloanele până la îndepărtarea produsului.

Pentru dezinfecția apei de băut cu păsările în hală, folosiți o diluție 1:1000.

Dezinfectoare:

Folosiți o diluție de 1:190 reîmprospătați soluția când e foarte murdară sau la fiecare 3-4 zile.

A SE FOLOSI:

Pentru boli ale păsărilor: 1 parte PEROXAN la 400 părți apă.

Cazuri speciale (*Salmonellosis*): 1 parte PEROXAN la 190 părți apă.





MURIBROM

pastă plic albastru 15 g/plic, 15 kg/cutie



Raticid



Substanță activă:
Brodifacoum 0,005%

Indicații:

Se va folosi în interiorul locuințelor particulare, în interiorul clădirilor și instalațiilor fixe sau mobile sau în apropierea lor (fără a se depăși distanța maximă de 0,5 m între stație și clădire/instalație), în stații corect etichetate. Produsul mai poate fi folosit și în canalizări, dacă este necesar, ferm atașat.

Administrare:

Șoareci (*Mus musculus*): capcane cu momeli cu 40 g produs la fiecare 10²m
Șobolani negri (*Rattus rattus*): capcane cu momeli cu 100 g produs la fiecare 10²m
Șobolani maro (*Rattus norvegicus*): capcane cu momeli cu 100 g produs la fiecare 10²m

MURIBROM

cub parafinat roșu 20 g/buc, 10 kg/cutie

grâu roșu 25 g/plic, 15 kg/cutie

pastă plic roșu 15 g/plic, 15 kg/cutie



Raticid



Substanță activă:
Bromadiolonă 0,005%

Indicații:

Se va folosi în interiorul locuințelor particulare, în interiorul clădirilor și instalațiilor fixe sau mobile sau în apropierea lor (fără a se depăși distanța maximă de 0,5 m între stație și clădire/instalație), în stații corect etichetate. Produsul mai poate fi folosit și în canalizări, dacă este necesar, ferm atașat.

Administrare:

Șoareci de casă (*Mus musculus*): capcane cu momeli cu 50 g produs la fiecare 5 - 10 m
Șobolani (*Rattus norvegicus*): capcane cu momeli de până la 200 g de produs, pline cu blocuri de 20 g produs, la fiecare 5 - 10 m
Șobolani maro (*Rattus norvegicus*) (Canalizări): 200 g de momeală pentru fiecare punct de aplicare, în blocuri de 20 g



MURIBROM momeală raticidă gata de utilizare 150 g momeală proaspătă



Raticid



Substanță activă:
Brodifacoum 0,005%

Indicații:

Se va folosi în interiorul locuințelor particulare, în interiorul clădirilor și instalațiilor fixe sau mobile, în stații corect etichetate. Amplasați stația de intoxicare în zona infestată.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare:
20-40 g de momeală/stație.

Numărul și calendarul de aplicare:

Dacă este nevoie de mai mult de o stație, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.

Specii țintă:

Șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*)

CAPCANĂ ȘI LIPICI PENTRU ȘOARECI



Compoziție:

Ulei mineral naftenic	67%
Poliizobutilenă	22%
Colofoniu	5%
Antioxidant 1010	3%
Cauciuc SIS	3%

Caracteristici:

- Adeziv puternic, ușor de utilizat
- Fără miros, prietenos cu mediul
- NON-TOXIC



✓ **EFICIENT**

✓ **NON-TOXIC**

MASTERFLY® BAIT

DINOTEFURAN

INSECTICID PENTRU COMBATEREA MUȘTELOR

EFICACITATE
de până la
8 LUNI



Dinotefuranul este un insecticid de ultimă generație, care omoară insectele acționând asupra receptorilor de la nivelul sistemului lor nervos, anume asupra unui tip de receptori colinergici, numiți receptori nicotinici.

Insecticid pudră pentru combaterea muștelor din locuințe, adăposturi de animale, spații industriale și împrejurimi.



- ✓ PULBERE SOLUBILĂ ÎN APĂ
- ✓ ACȚIUNE FOARTE RAPIDĂ
- ✓ ACȚIUNE DE LUNGĂ DURATĂ
- ✓ ACȚIONEAZĂ PRIN INGESTIE ȘI CONTACT



Disponibil la:
125 g și 500 g




(Conține recipient de dozare
în interiorul flaconului)

INSECTICID INOVATIV CU EFECT **DE LUNGĂ DURATĂ** PENTRU COMBATEREA MUȘTELOR



DOZATOARE MIXRITE

- arcuri de plastic
- buton on/off
- set de 3 garnituri de schimb



Dozator MixRite 2.5 0,3% - 2%

Tip dozator	Utilizare	Debit de presiune	Interval de dozare	Frecvența	Conectori	Debite de injectare/h Min.-Max.	Greutate brută
MixRite 2.5 0,3% - 2%	Zootehnie/ Irigare/ Clor/Acizi/ Spălătorie auto	7-2500 l/h	0.2-8 bari 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.021 - 50 l/h	1.8 KG



Dozator MixRite 3.5 0.5% - 5%

Tip dozator	Utilizare	Debit de presiune	Interval de dozare	Frecvența	Conectori	Debite de injectare/h Min.-Max.	Greutate brută
MixRite 3.5 0.5% - 5%	Zootehnie/ Irigare/ Clor/Acizi/ Spălătorie auto	10-3500 l/h	0.2-8 bari 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	3/4" BSPT	0.05 - 175 l/h	1.9 KG



Dozator MixRite TF-10 0,1%-1%

Tip dozator	Utilizare	Debit de presiune	Interval de dozare	Conectori	Debite de injectare/h Min.-Max.	Greutate brută
MixRite TF-10 0,1%-1%	Irigare/ Clor	100-10000 l/h	1-8 bari	1 1/2" BSPT	0.1 - 100 l/h	7.3 KG



Seringă automată 1, 2, 3 și 5 ml P albastru Flacon

Descriere produs:

- seringă automată de uz veterinar, destinată administrării cu precizie și în serie a medicamentelor veterinare;
- se pretează pentru administrarea în masă la toate speciile de animale și pentru toate tipurile de soluții (apoase, uleioase).

Caracteristici tehnice:

- ușor de dezasamblat, componentele sunt ușor accesibile, se curăță foarte ușor și se sterilizează la 130° Celsius;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 ml în 0,5 ml, până la 1, 2, 3 și 5 ml, dotată cu un suport rigid pentru flacon, acesta fiind prevăzut cu un ac de alimentare ce pătrunde în flacon;
- piesele se pot înlocui cu ușurință; se comercializează împreună cu uleiul de întreținere;
- mâner din plastic;
- cilindru gradat, transparent din plastic;
- pistonul din plastic culisează perfect în cilindru din plastic;
- volumul de administrat se setează cu ușurință cu ajutorul unui limitator micrometric din plastic fixat pe piston.

Seringă automată A metalică 0,1-2 ml Furtun

Descriere produs:

Este destinată pentru injectarea soluțiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:

- ușor de dezasamblat, componentele sunt ușor accesibile, se curăță foarte ușor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu ușurință;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindru din plastic;
- volumul se reglează cu ușurință prin rotirea mânerului și se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare

Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic.



Seringă automată B metalică 0,1-1 ml Furtun

Descriere produs:

Este destinată pentru injectarea soluțiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:

- ușor de dezasamblat, componentele sunt ușor accesibile, se curăță foarte ușor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 1 ml;
- piesele se pot înlocui cu ușurință;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindru din plastic;
- volumul se reglează cu ușurință prin rotirea mânerului și se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare

Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic





Seringă automată B metalică 0,1-2 ml Furtun

Descriere produs:

Este destinată pentru injectarea soluțiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:

- ușor de dezasamblat, componentele sunt ușor accesibile, se curăță foarte ușor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu ușurință;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindru din plastic;
- volumul se reglează cu ușurință prin rotirea mânerului și se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare

Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic



Seringă automată K pistol 2 ml Furtun

Descriere produs:

Este destinată pentru injectarea soluțiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:

- ușor de dezasamblat, componentele sunt ușor accesibile, se curăță foarte ușor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 în 0,5 ml până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu ușurință;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru metalic, încorporat în mâner;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindru metalic;
- volumul se reglează cu ușurință prin rotirea dispozitivului rotund din capătul mânerului și se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare

Piese de rezervă: set de garnituri



HSW seringă PLEXIGLAS - TU FLEX-MASTER® 10 ml LL

Versiunea A – pentru dozare ușoară

VERSIUNEA A

Descriere produs:

- Seringă ajustabilă hipodermică din plastic TPX
 - Dozare ușoară
 - Duza Luer Lock metalică, interschimbabilă
 - Autoclavabilă (se sterilizează la 134°)
 - Ambalat individual
 - Duza de administrare disponibilă ca accesoriu
- VERSIUNEA A - pentru dozare ușoară

Sistem Luer Lock Vol/ml
5 ml LL, 20 ml LL, 50 ml LL





HSW seringă automată ECO-MATIC® 1 ml, 2 ml, 5 ml

Seringă automată cu auto-umplere, cu suport pentru flacoanele medicale

Descriere produs:

- Seringă din plastic de calitate superioară, cu cilindru din plastic durabil
- Atașament pentru ac din metal rezistent la transfer
- Acuratețe maximă, dozaj precis și continuu
- Raport excelent calitate-preț
- Design ergonomic și compact, care permite ușurință în utilizare
- Cilindru din plastic durabil, disponibil în două dimensiuni, asigurând:
 - fixare sigură a flacoanelor veterinare
 - protecția recipientului împotriva șocurilor
 - schimbarea rapidă și ușoară a flacoanelor veterinare (50 ml-250 ml)

Include:

HSW ECO MATIC® 1 x Seringă cu suport pentru flacoanele medical

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)
	2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)
	5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)



HSW seringă automată ECO-MATIC® 5 ml

Seringă automată cu auto-umplere, cu furtun atașat

Descriere produs:

- Seringă din plastic de calitate superioară, cu cilindru din plastic durabil
- Atașament pentru ac din metal rezistent la transfer
- Acuratețe maximă, dozaj precis și continuu
- Raport excelent calitate-preț
- Design ergonomic și compact, care permite ușurință în utilizare

Include:

HSW ECO-MATIC® 1 x Seringă cu furtun atașat

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)



HSW seringă automată MULTI-MATIC 25 ml LL, 50 ml LL

Seringă automată cu dozare multiplă

Descriere produs:

Mâner durabil din aluminiu turnat sub presiune - durabilitate excelentă

- Cilindru din plastic de clasă medicală:
 - cu accesoriu metalic pentru ac
 - biocompatibil – autoclavabil (134°C/273°F)
 - rezistent chimic la toate medicamentele cunoscute
 - rezistență la razele UV și la șocuri
- Acuratețe mare în dozare - toleranță < 1%
- Dozare ușoară - roțiță pentru dozare: 0,5ml (25 ml) sau 1ml (50 ml)
- Design ergonomic pentru o utilizare ușoară - ușor de dezasamblat

HSW MULTI-MATIC 1 x Seringă

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	25 ml
	50 ml





MedX Covor dezinfecție



Dimensiuni:

- 80 * 60 * 3 cm

- 180 * 90 * 3 cm

Foarfece MedX

MEDX FOARFECĂ CURBĂ A/A; A/B; B/B

MEDX FOARFECĂ DREAPTĂ A/A; A/B; B/B



Diferite mărimi: 13 - 20 cm



MĂNUȘI

Mănuși chirurgicale sterile pudrate 65 S, 75 M, 85 L

Mănuși examinare latex S, M, L, XL

Mănuși examinare nitril S, M, L, XL



Scafă aluminiu - 1,6 kg - 2,5 kg

Scafă rotundă din aluminiu pentru hrănire și pentru cântărirea concentratului furajer



Bonete bufante albastre cu elastic

Bonete medicale recomandate pentru utilizarea în cabinetele medical veterinar private, centre și clinici veterinare, laboratoare, centre de îngrijire și creștere a animalelor, spații cu cerințe de igienă ridicate.



Botoșei chirurgicali

VIZITEAZĂ SITE-UL BISTRI-VET

www.bistrivet.ro



design nou
conținut actualizat
interfață intuitivă
catalog complet de produse