



ADDICT® GEL

GEL INSECTICID GANDACI GATADE UTILIZARE

COMPOZITIE

Dinotefuran (CAS 165252-70-0) 2% m/m
 Numar autorizatie UK-2017-1064 (LODI S.A.S. France)

AVANTAJE

- Substanta activa moderna
- Neutralizare rapida
- Nicio rezistenta raportata
- Compatibil tuturor procedurilor DDD

RATE DE APLICARE

Numai pentru utilizare in interior. Pentru utilizare in spatii comerciale si industriale, proprietati casnice, zone private si publice (de exemplu, spitale, case de batrani). Aplicati direct pe crapaturi sau ca tratament local.

Gandacul German: Aplicati 2 x 0,1 g momeala gel pe metru patrat
 Gandacul Oriental: Aplicati 4 x 0,1 g momeala gel pe metru patrat

Dublarea ratei de aplicare in caz de infestare puternica.
 Aplicati maximum 16 puncte de momeala gel in proprietatile casnice si pana la 72 de puncte atunci cand tratati orice zone comerciale, industriale sau publice.
 O aplicare repetata poate fi necesara la 7 zile dupa tratamentul initial.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Pentru aplicarea gelului, scoateti capacul de pe duza, atingeti varful duzei de suprafata de tratat si apasati usor pistonul.
- Reaplicati in functie de nivelul de infestare ramas si atunci cand momeala nu mai este prezenta vizibil. Puneti capacul pentru depozitarea produsului.
- Folositi doar ca tratament local in zone care nu vor fi accesibile, nu vor fi inundate si unde momeala nu ar fi indepartata prin curatarea de rutina. Pentru a mentine gustul produsului, aplicati departe de surse de caldura.

Metoda de aplicare a tratamentului local:

Scoateti capacul de la varful tubului aplicator. Asezati varful in locul in care urmeaza sa fie aplicat gelul. Apasati pistonul pana cand este distribuita cantitatea corespunzatoare. Puneti capacul cand ati terminat de distribuit gel.

Metoda de aplicare a fisurilor si crapaturilor:

Momeala gel ar trebui aplicata direct in crapaturile si crapaturile unde se ascund insectele. Puneti varful aplicatorului direct in fisuri si crapaturi si aplicati gelul. Momeala trebuie sa fie in zona goala si nu pe suprafete deschise sau expuse.



AMBALARE

Cutie cu tuburi 4 x 30g

INSTRUCTIUNI DE PRIM-AJUTOR

Ingerare: clatiti gura cu apa. Solicitati imediat asistenta medicala. Induceti varsaturile conform instructiunilor personalului medical. Nu administrati niciodata nimic pe cale orala unei persoane inconsiante sau aflate in convulsii. Inhalare: daca nu va simtiti bine, iesiti imediat la aer curat. Solicitati asistenta medicala daca apar tuse sau alte simptome. Daca persoana care a inhalat nu respira, faceti respiratie artificiala. Daca respiratia este dificila, administrati oxigen. Contact cu pielea: indepartati imediat imbracamintea si incaltamintea contaminate. Clatiti pielea si curatati cu cantitati mari de apa. Solicitati asistenta medicala daca apar simptome.

Contact cu ochii: clatiti imediat cu multa apa. Separati pleoapele cu degetele pentru a asigura clatirea riguroasa. Verificati si indepartati lentilele de contact daca este posibil. Solicitati asistenta medicala daca iritarea persista. Precautii personale: purtati echipament adecvat. Protectia ochilor/fetei: ochelari de protectie. Protectia mainilor si a corpului: manusi rezistente la substante chimice, casca de protectie, imbracaminte de protectie, cizme de siguranta. Protectie respiratorie: masca cu filtru respirator.

DE UTILIZAT NUMAI DE OPERATORI PROFESIONISTI

NU UTILIZATI acolo unde alimentele sau apa pot fi contaminate. Spalati mainile si pielea expusa inainte de masa si dupa utilizare.

PASTRATI INTR-UN LOC SIGUR

A nu se lasa la indemana copiilor

NU APLICATI IN SAU IN JURUL canalelor de scurgere

NU aplicati acest produs in zone usor accesibile copiilor sau animalelor
 NUMAI PENTRU UZ INTERIOR

NU contaminati paraiele, raurile sau caile navigabile cu produsul sau recipientele folosite