

SOLFAC COMBI MAXX

Insecticid concentrat utilizat pentru combaterea artropodelor – țânțari, gândaci, ploșnițe de pat, furnici, muște și alte insecte târâtoare și zburătoare

Substanțe active: Deltamethrin 2 % + Prallethrin 0,6 % + Piperonyl butoxide 0,6 %
Formulare: SC (Suspensie concentrată)

MOD DE ACTIUNE

SOLFAC® COMBI Maxx este un insecticid concentrat care conține doi piretroizi sintetici combinați cu un agent sinergic.

Prallethrin-ul oferă un efect de șoc imediat, urmat de un knock-down consistent; deltametrin-ul este fotostabil și garantează o activitate de anihilare și control a dăunătorilor, având, de asemenea și o activitate reziduală bună, iar piperonil butoxid-ul îmbunătățește activitatea biocidă de contact, protejează ingredientele active atât împotriva degradării enzimactice, cât și ajută piretroizii să penetreze în corpul insectei.

Caracteristica principală a **SOLFAC® COMBI Maxx** este efectul său imediat rapid și letal combinat cu o activitate reziduală lungă.

SOLFAC® COMBI Maxx oferă de asemenea un efect puternic de „flush-out”, de „extragere” a dăunătorilor din ascunzișuri, prin urmare, este recomandat pentru controlul atât al insectelor zburătoare, cât și târâtoare.

Datorită compoziției sale speciale, **SOLFAC® COMBI Maxx** are și un efect repelent, îndepărtând (ținând departe) insectele de suprafețele tratate.

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE

SOLFAC® COMBI Maxx poate fi aplicat cu pompa reziduală de spate (vermorel), atât cu presiune scăzută (< 2 atm.), cât și cu presiune ridicată (pulverizatoare electrice), dar și cu atomizoare sau nebulizatoare ULV, luând, însă, în calcul, folosirea unor diuze mai mari, pentru a împiedica înfundarea acestora.

Produsul poate fi aplicat în zone urbane locuite (locuințe rezidențiale, centre comerciale, școli, grădinițe, spitale), areale industriale (industria alimentară, depozite) sau ferme de animale și păsări.

DOZE DE APLICARE RECOMANDATE ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE:

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare
Prin pulverizare	– Țânțari (<i>Aedes spp.</i> , <i>Culex spp.</i>) Concentrația soluției de lucru: 0,4% (4 ml produs într-un litru apă) Doza de aplicare: 1 L soluție de lucru pentru 10 m ²
	– Gândaci (<i>Blatta orientalis</i> , <i>Blattella germanica</i>) Concentrația soluției de lucru: 0,75% (7,5 ml produs într-un litru apă) Doza de aplicare: 1 L soluție de lucru pentru 10 m ²
	– Ploșnițe (<i>Cimex lectularius</i>), Furnici (<i>Lassius niger</i>) Concentrația soluției de lucru: 0,75% (7,5 ml produs într-un litru apă) Doza de aplicare: 1 L soluție de lucru pentru 10 m ²

Înainte de utilizare citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !